

Patient's Handbook
CHAPTER 13 - INFORMED CONSENT

BREAST AUGMENTATION

INSTRUCTIONS

This is an informed-consent document that has been prepared to help inform you about augmentation mammoplasty, its risks, and alternative treatments.

It is important that you read this information carefully and completely. Please initial each page, indicating that you have read the page and sign the consent for surgery as proposed by your plastic surgeon.

GENERAL INFORMATION

Augmentation mammoplasty is a surgical operation performed to enlarge the breasts for a number of reasons:

To enhance the body contour of a woman, who for personal reasons feels that her breast size is too small.
To correct a loss in breast volume after pregnancy.

To balance breast size, when there exists a significant difference between the sizes of the breasts.

To restore breast shape after partial or total loss of the breasts for various conditions.

To replace existing breast implants for cosmetic or reconstructive reasons.

Breast implant surgery is contraindicated in women with untreated breast cancer or pre-malignant breast disorders, active infection anywhere in the body, or individuals who are currently pregnant or nursing. Individuals with a weakened immune system (currently receiving

شفط الدهون / وتحتيف الجسم - الفصل الثالث
عشر - دليل المريض

تكبير حجم الصدر

تعليمات:

هذه وثيقة موافقة بالعلم تم إعدادها لإعلامك عن جراحة تكبير حجم الصدر بزرع الأعضاء، ومخاطرها، وسبل العلاج البديلة

من المهم قراءة هذه المعلومات كاملة وبغناية يرجى التوقيع على كل صفحة مما يعني ذلك قراءتها وتوافق على الجراحة التي اقترحها طبيبك الجراح.

معلومات عامة:

عملية تكبير الثدي هي عملية جراحية يتم

إجرائها لتكبير الثديين لعدد من الأسباب

• لتعويض فقدان في حجم الصدر بعد الحمل.

• لضبط حجم الصدر وذلك عندما يكون الفرق كبير بين حجم الثديين.

• لاسترداد شكل الصدر بعد فقدان جزئي أو كلي للصدر لظروف مختلفة.

• لاستبدال أعضاء الصدر المزروعة حالياً لأسباب تجميلية أو لإعادة الشكل.

لا يتم إجراء جراحة زرع أعضاء الصدر للسيدات اللاتي لم يتم علاجهن من سرطان الصدر أو من هن معرضون للإصابة باضطرابات جينية في الصدر، أو لديهن أي نشاط مرضي في أي مكان في الجسم، أو الحوامل أو المرضعات.

chemotherapy or drugs to suppress the immune system), conditions that interfere with blood clotting or wound healing, or have reduced blood supply to the breast tissue from prior surgery or radiation therapy treatments may be at greater risk for complications and poor surgical outcome. According to the USFDA, a woman must be at least 18 years of age for cosmetic breast augmentation.

الأشخاص أصحاب الجهاز المناعي الضعيف. اللاتي يتلقون علاجا كيميائيا في الفترة الحالية أو أدوية (تؤثر على الجهاز المناعي) أو الحالات التي تتعارض مع تجلط الدم أو علاج الجروح أو لا يصل الدم لدهن إلي أنسجة الصدر بسبب جراحة سابقة أو يتلقون علاج بالأشعة، هؤلاء يتعرضون لمخاطر كبرى من حدوث مضاعفات أو نتائج جراحية ضعيفة وفقا لمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية، يجب ألا يقل سن المرأة الراغبة في تكبير الصدر التجميلي عن 18 عام.

Breast enlargement is accomplished by inserting a breast implant either behind the breast tissue or under the chest muscles. Incisions are made to keep scars as inconspicuous as possible, usually under the breast, around the lower part of the areola, or in the armpit. Breast implants are manufactured in a variety of shapes, sizes, and with either smooth or textured surfaces. The method of implant selection and size, along with surgical approach for inserting and positioning breast implants will depend on your preferences, your anatomy and your surgeon's recommendation. The shape and size of the breasts prior to surgery will influence both the recommended treatment and the final results. If the breasts are not the same size or shape before surgery, it is unlikely that they will be completely symmetrical afterward.

يتم تكبير الصدر عن طريق إدخال عضو يزرع في الصدر إما خلف أنسجة الصدر أو تحت عضلات الصدر. عند إجراء الفتح الجراحي يراعى أن تكون الندب مخفية وغير ظاهرة بقدر الإمكان عادة تحت الصدر، حول الجزء السفلي من منطقة حلمة أو تحت الإبط. يتم تصنيع الأعضاء المزروعة بأشكال متنوعة، وأحجام مختلفة لها سطح ناعم أو غير ناعم الملمس. يتوقف اختيار الأعضاء على أفضل ما يناسبك والتركيب العضوي بجسمك وتوصيات طبيبك الجراح. إن شكل وحجم الصدر قبل الجراحة هما اللذان يتوقف عليهما أسلوب العلاج الذي يوصي به وكذلك النتائج النهائية إذا كان حجم وشكل الثديين مختلفان قبل الجراحة، فلن يكون من الممكن أن يتمثلان بعد ذلك.

Conditions which involve sagging of the breast or diminished skin tone (stretch marks) may require additional surgical procedures (breast lift) to reposition the nipple and areola upward and to remove loose skin

إن الحالات التي يكون فيها الصدر مترهلا ويكون الجلد ضعيف وليس فيه البريق الطبيعي (علامات شد على الجلد)، قد تحتاج إلي إجراءات جراحية إضافية (شد الصدر) لإعادة شكل الحلمة ورفع المنطقة المحيطة بالحلمة إلي أعلي وإزالة ترهل الجلد.

Patients undergoing augmentation mammoplasty surgery must consider the following:

يجب على مرضي جراحة تكبير الصدر بزراعة الأعضاء، أن يأخذوا في الاعتبار الآتي:
التغيرات التي تحدث للصدر بعد التكبير أو إعادة البناء بالأعضاء المزروعة لا يمكن

Changes that occur to the breasts following augmentation or reconstruction with implants are not reversible. There may be an unacceptable appearance to the breast if you later choose to have breast implants removed.

ALTERNATIVE TREATMENT

Augmentation mammoplasty is an elective surgical operation. Alternative treatment would consist of the use of external breast prostheses or padding, or the transfer of other body tissues to enlarge breast size.

Risks Of Augmentation Mammoplasty Surgery

Every surgical procedure involves a certain amount of risk and it is important that you understand the risks involved with augmentation mammoplasty. Additional information concerning breast implants may be obtained from the FDA, package-insert sheets supplied by the implant manufacturer, or other information pamphlets.

An individual's choice to undergo a surgical procedure is based on the comparison of the risk to potential benefit. Although the majority of women do not experience the following complications, you should discuss each of them with your plastic surgeon to make sure you understand the risks, potential complications, and consequences of breast augmentation. Problems associated with breast implants can be inherent to this type of implanted medical device or relate to complications of a surgical procedure. Additional advisory information regarding this subject should be reviewed by patients considering surgery that involves breast implants.

تعديلها. قد يكون هناك مظهر غير مقبول للصدر إذا أردت بعد ذلك إزالة هذه الأعضاء المزروعة.

العلاج البديل:

إن جراحة تكبير الصدر بزرع الأعضاء هي عملية جراحية اختيارية، العلاج البديل قد يتطلب استخدام أعضاء صناعية أو حشوات أو نقل أنسجة من جسم آخر لتكبير حجم الصدر.

مخاطر جراحة تكبير الصدر بزرع الأعضاء:
يتضمن كل إجراء جراحي نسبة معينة من المخاطر ومن المهم أن تتفهم المخاطر المحيطة بجراحة تكبير الصدر بزرع الأعضاء يمكن الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بزرع أعضاء الصدر من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أو الكتيبات التي تصدر من الجهات المصنعة لأعضاء الصدر أو أي كتيبات أو معلومات أخرى.

عند اختيار المرأة لخوض مثل هذه الجراحة،
يجب أن تتم المقارنة بين المخاطر والفوائد المحتملة رغم أن معظم السيدات لا تحدث لهن المضاعفات التي تلي الجراحة، إلا أنه يجب عليك مناقشة كل منها مع طبيبك الجراح للتأكد من أنك تفهم المخاطر والمضاعفات المحتملة ونتائج تكبير الصدر. يمكن أن تكون المشاكل المرتبطة بزرع أعضاء الصدر، بسبب الأدوات الطبية المزروعة أول لها علاقة بمضاعفات الإجراء الجراحي. يجب على المرضى الذين يأخذون في الاعتبار جراحة زرع أعضاء الصدر مراجعة المزيد من المعلومات والإرشادات الإضافية بخصوص هذا الموضوع.

While every patient experiences her own individual risks and benefits following breast implant surgery, clinical data suggests that most women will be satisfied with the outcome of breast implant surgery despite the occurrence of problems inherent with breast implant surgery.

Inherent Risks of Breast Implants:

Implants- Breast implants, similar to other medical devices, can fail. Implants can break or leak. Rupture can occur as a result of an injury, from no apparent cause, or during mammography. It is possible to damage an implant at the time of surgery. Damaged or broken implants cannot be repaired. Ruptured or deflated implants require replacement or removal. However, the new generation implants are stronger and the silicone is more cohesive to avoid leaks or deflation.

Capsular contracture- Scar tissue, which forms internally around the breast implant as a foreign body reaction to seal off the implant, can tighten and make the breast round, firm, and possibly painful. Excessive firmness of the breasts can occur soon after surgery or years later. The occurrence of symptomatic capsular contracture is not predictable. The incidence of symptomatic capsular contracture can be expected to increase over time. Capsular contracture may occur on one side, both sides or not at all. It is more common with implant placement in front of the chest muscle layer. Treatment for capsular contracture may require surgery, implant replacement, or implant removal. Capsular contracture may

بينما تمر كل سيدة بمخاطرها وفوائدها الخاصة بها التي تلي جراحة زرع أعضاء الصدر، فإن البيانات الطبية تفيد بأن معظم السيدات ستكون راضيات عن نتائج جراحة زرع أعضاء الصدر بالرغم من حدوث مشاكل مصاحبة لتلك الجراحة.

المخاطر المصاحبة لزراعة أعضاء الصدر:

الأعضاء المزروعة- أعضاء الصدر المزروعة، تتشابه مع الأدوات الطبية الأخرى، تتعرض للفشل. يمكن للأعضاء المزروعة أن تنكسر أو يحدث بها تسريب، يمكن أن تتعرض للفشل. يمكن أن يحدث تمزق بسبب إصابة، أو لأسباب غير واضحة أو أثناء إجراء الأشعة التي تحدد مكان أورام الصدر لتشخيصها. من الممكن إتلاف أي عضو مزروع أثناء الجراحة لا يمكن إصلاح الأعضاء المزروعة التالفة أو المكسورة. تتطلب الأعضاء المزروعة المتمزقة أو المنهارة تتطلب إما إزالة أو استبدال. ومع ذلك فإن الجيل الجديد من الأعضاء المزروعة قوية والسليكون متماسك أكثر لتجنب التسريب أو الانهيار.

تيبس وشد في الصدر- الأنسجة التي بها ندب التي تتكون داخليا حول العضو المزروع كرد فعل لجسم غريب لتصدي للعضو المزروع يمكن أن تتسبب في عمل شد فيستدير الصدر ويتيبس وقد يكون هناك ألم. يمكن أن يحدث تيبس شديد للصدر بعد الجراحة مباشرة أو بعد عدة أعوام. لا يمكن التنبؤ بحدوث أعراض تيبس وشد الصدر. يمكن أن تزداد أعراض تيبس وشد الصدر مع الوقت يمكن أن يحدث التيبس والشد في ثدي واحد أو الاثنان أو لا يحدث إطلاقاً. من الشائع حدوث ذلك مع الأعضاء المزروعة في الطبقة العضلية الأمامية من الصدر. قد يتطلب تيبس وشد الصدر جراحة، أو استبدال العضو المزروع، أو إزالته، قد يحدث تيبس وشد الصدر مرة أخرى بعد العمليات الجراحية لعلاج هذه الحالة

reoccur after surgical procedures to treat this condition.

Skin wrinkling and rippling- Visible and palpable wrinkling of implants can occur. Some wrinkling is normal and expected. This may be more pronounced in patients with thin breast tissue. Wrinkling and/or folds may be confused with palpable tumors and questionable cases must be investigated. An implant may become visible at the surface of the breast as a result of the device pushing through layers of skin. The chance of the above problem is less with new generation cohesive implants which is the doctor's preferred choice.

Change in nipple and skin sensation- Some change in nipple sensation is not unusual right after surgery. After several months, most patients have normal sensation. Partial or permanent loss of nipple and skin sensation may occur occasionally. Changes in sensation may affect sexual response or the ability to breast feed a baby.

Calcification- Calcium deposits can form in the scar tissue surrounding the implant and may cause pain, firmness, and be visible on mammography. These deposits must be identified as different from calcium deposits that are a sign of breast cancer. Should this occur, additional surgery may be necessary to remove and examine calcifications.

Implant displacement- Displacement, rotation, or migration of a breast implant may occur from its initial placement and can be accompanied by discomfort and/or distortion in breast shape. Unusual techniques of implant placement may increase the risk of displacement or migration. Additional

تجاعيد وترهلات الجلد- يمكن أن تحدث تجاعيد مرئية ومحسوسة للأعضاء المزروعة، بعض هذه التجاعيد طبيعية ومتوقعة. قد يكون هذا أكثر توقعاً مع المرضى أصحاب أنسجة الصدر الرفيعة قد يحدث خلط ما بين التجاعيد و/أو الثنيات للتورمات المحسوسة ولا بد من فحص مثل هذه الحالات المشكوك فيها. قد يصبح العضو المزروع مرئي على سطح الصدر كنتيجة لدفع هذه الأداة خلال طبقات الجلد. ولكن قليل ما تحدث هذه المشكلة مع الجيل الجديد من الأعضاء المزروعة لأنها أكثر تماسكا وهي الاختيار الأمثل لدى الأطباء.

التغير في الإحساس بالجلد والحلمات- من غير المعتاد حدوث تغير في الإحساس بالحلمات بعد الجراحة مباشرة. بعد عدة شهور يكون لدى المرضى إحساس عادي قد يحدث من فترة إلى أخرى الإحساس بفقدان جزئي أو كلي للجلد والحلمات. قد يؤثر هذا التغير في الإحساس على الاستجابة الجنسية أو القدرة على رضاعة الطفل.

تجمع أملاح الكالسيوم- يمكن أن تتجمع أملاح الكالسيوم في صورة متحجرة داخل الأنسجة التي بها ندب حول العضو المزروع وقد تسبب الألم وتيبس ويمكن رؤيتها بأشعة فحص الصدر. وتختلف تجمعات الكالسيوم هذه عن مثيلاتها المتعلقة بمرض سرطان الصدر. في هذه الحالة قد يكون من الضروري إجراء جراحة إضافية لإزالة وفحص هذه الأملاح.

تحرك العضو المزروع من مكانه- قد يحدث تحرك أو التفاف أو خروج العضو المزروع من مكانه الأصلي ويمكن أن يصاحب ذلك قلق وعدم ارتياح و/أو عدم انتظام في شكل الصدر الأساليب غير المعتادة في وضع الأعضاء المزروعة قد تزيد من مخاطر انتقالها أو خروجها من مكانها. قد

surgery may be necessary to correct this problem

Surface contamination of implants- Skin oil, lint from surgical drapes, or talc may become deposited on the surface of the implant at the time of insertion. The consequences of this are unknown.

Breast feeding- Many women with breast implants have successfully breast fed their babies. It is not known if there are increased risks in nursing for a woman with breast implants. A study measuring elemental silicon (a component of silicone) in human breast milk did not indicate higher levels from women with silicone-filled gel implants when compared to women without implants. Cow's milk contains higher levels of elemental silicon as compared to human milk. Implant placement techniques that involve incisions through the nipple and areola locations may reduce the ability to successfully breast feed. If a woman has undergone a mastectomy, it is unlikely that she would be able to breast feed a baby on the side where the breast was removed.

Unusual activities and occupations- Activities and occupations which have the potential for trauma to the breast could potentially break or damage breast implants, or cause bleeding/seroma

Inherent Surgical Risk of Breast Implant Surgery:

Bleeding- It is possible, though unusual, to experience a bleeding episode during or after surgery. Should post-operative bleeding occur, it may require emergency

تكون هناك ضرورة لإجراء جراحة إضافية لتصحيح هذه المشكلة.

تلوث سطح الأعضاء المزروعة- قد تتجمع زيوت الجلد أو السوائل المتسربة من حواف ملابس العمليات أو بذرته التلك، على سطح العضو المزروع أثناء إدخاله. نتائج ذلك غير معروفة.

الرضاعة الطبيعية- نجحت الكثير من السيدات في إرضاع أطفالهن بينما لديهم أعضاء الصدر المزروعة. ليس معروفة إذا كان هناك مخاطر في الرضاعة على السيدة التي لديها أعضاء مزروعة بالصدر. بينت إحدى الدراسات التي تقيس معدل نوع السيلكون المخصص لزرع في الجسم (عنصر السيلكون في العضو المزروع) لم يرتفع معدله في لبن صدر المرأة عن السيدات أصحاب الأعضاء المزروعة التي تتكون من جل من السليكون بالمقارنة بالسيدات اللاتي بدون أعضاء مزروعة. يحتوي لبن البقر على معدلات أعلى من السليكون المخصص لزرع الأعضاء وبالمقارنة بلبن الإنسان. إن أساليب زراعة الأعضاء عن طريق عمل فتحات جراحية في الحلمة والمناطق المحيطة بها قد يقلل من القدرة على الرضاعة الطبيعية بنجاح. إذا كانت السيدة قد أجرت إزالة للثدي سيكون من غير المحتمل إمكانية قيامها بالرضاعة الطبيعية من الناحية التي أزيل منها الثدي.

نوع العمل الوظيفي والأنشطة غير العادية- يمكن أن تؤدي في الأعمال والأنشطة التي يحتمل أن تسبب إصابة في الصدر، إلى كسر أو تلف الأعضاء المزروعة بالصدر، أو تسبب نزيف/ خروج سوائل.

المخاطر المحيطة بجراحة زرع الأعضاء بالصدر:

النزيف - من الممكن، رغم أنه غير معتاد، أن يحدث نزيف أثناء أو بعد الجراحة إذا حدث نزيف بعد الجراحة، فقد يتطلب ذلك علاج طارئ لإخراج الدم المتجمع (تجمع وتورم الدم داخل الأنسجة). لا تأخذي أي أسبرين أو أي

treatment to drain accumulated blood (hematoma). Do not take any aspirin or anti-inflammatory medications for ten days before surgery, as this may increase the risk of bleeding. Non-prescription "herbs" and dietary supplements can increase the risk of surgical bleeding. Hematoma can occur at any time following injury to the breast.

Seroma- Fluid may accumulate around the implant following surgery, trauma or vigorous exercise. Additional treatment may be necessary to drain fluid accumulation around breast implants. This may contribute to infection, capsular contracture, or other problems.

Infection- Infection is unusual after this type of surgery. It may appear in the immediate post operative period or at any time following the insertion of a breast implant. Subacute or chronic infections may be difficult to diagnose. Should an infection occur, treatment including antibiotics, possible removal of the implant, or additional surgery may be necessary. Infections with the presence of a breast implant are harder to treat than infections in normal body tissues. If an infection does not respond to antibiotics, the breast implant may have to be removed. After the infection is treated, a new breast implant can usually be reinserted. It is extremely rare that an infection would occur around an implant from a bacterial infection elsewhere in the body, however, prophylactic antibiotics may be considered for subsequent dental or other surgical procedures. In extremely rare instances, life-threatening infections, including toxic shock syndrome have been noted after breast implant surgery.

أدوية مضادة للالتهابات لمدة 10 أيام قبل الجراحة، حيث قد يزيد ذلك من مخاطر النزيف، الأعشاب والمكملات الغذائية التي تؤخذ بدون وصفة طبية يمكن أن تزيد مخاطر النزيف عند الجراحة، يمكن أن يحدث تجمع وتورم الدم داخل الأنسجة في أي وقت بعد إصابة الصدر.

خروج السوائل- قد تتجمع السوائل حول العضو المزروع بعد الجراحة، أو بسبب تمارين مجهدة، قد يكون هناك ضرورة لعلاج إضافي لتصفية السائل المتجمع حول الأعضاء المزروعة بالصدر. قد يؤدي ذلك إلى إصابة أو تيبس وشد بالصدر أو مشاكل أخرى.

الإصابة - الإصابة غير معتادة بعد هذا النوع من الجراحة. قد تظهر في الفترة ما بعد العملية مباشرة أو في أي وقت بعد إدخال عضو الصدر المزروع قد يكون م الصعب تشخيص الإصابات المفاجئة أو المزمنة في حالة حدوث إصابة، قد يكون من الضروري العلاج بالمضادات الحيوية أو احتمال إزالة العضو المزروع أو جراحة إضافية.

إن علاج الإصابات في حالة وجود أعضاء مزروعة باصدر يكون أصعب من علاجها في أنسجة الجسم العادية. إذا لم تستجب الإصابة للمضادات الحيوية، قد يتم إزالة العضو المنزوع بالصدر، بعد علاج الإصابة، يمكن عادة وضع عضو مزروع جديد بالصدر من النادر جداً حدوث إصابة حول العضو المزروع بسبب البكتيريا في أي مكان بالجسم ومع ذلك يمكن تناول مضادات حيوية كإجراء وقائي بعد أي إجراء جراحي في الأسنان أو أي جراحة أخرى في حالات نادرة جداً لوحظ وجود إصابة تهدد الحياة، تشمل أعراض اختناق بالتسمم بعد جراحة زرع الأعضاء بالصدر.

Skin scarring- Excessive scarring is uncommon. In rare cases, abnormal scars may result. Scars may be unattractive and of different color than surrounding skin. Additional surgery may be needed to treat abnormal scarring after surgery.

Surgical anesthesia- Both local and general anesthesia involves risk. There is the possibility of complications, injury, and even death from all forms of surgical anesthesia or sedation.

Allergic reactions- In rare cases, local allergies to tape, suture material, or topical preparations have been reported. Systemic reactions which are more serious may result from drugs used during surgery and prescription medicines. Allergic reactions may require additional treatment.

Thrombosed veins- Thrombosed veins, which resemble cords, occasionally develop in the area of the breast and resolve without medical or surgical treatment.

Pain- Pain of varying intensity and duration may occur and persist after breast implant surgery. Pain may be the result of improper implant size, placement, surgical technique, capsular contracture, or sensory nerve entrapment or injury.

Additional Breast Implant Advisory Information:

Breast cancer- Current medical information does not demonstrate an increased risk of breast cancer in women who have breast implant surgery for either cosmetic or reconstructive purposes. It is recommended that all women perform periodic self examination of their breasts, have mammography according to

ندب الجلد – من غير الشائع حدوث ندب بشكل كبير في حالات نادرة قد تحدث ندب غير عادي وهي غير مرغوب فيها ويختلف لونها عن الجلد المحيط بها قد تكون هناك حاجة إلى جراحة إضافية لعلاج الندب غير العادية بعد الجراحة.

تخدير الجراحة- لكل م التخدير الموضعي والكلبي مخاطره، هناك احتمال حدوث مضاعفات، وإصابة وحتى الموت من جميع أشكال التخدير الجراحية أو المهدئات.

ردود الافعال بسبب الحساسيه — في حالات نادره لاحظنا وجود حساسيه فى اماكن وضع الشرائط او مواد الخياطه ،او المستحضرات السطحيه .ردود افعال اجهزه الجسم وهى الكثر خطوره قد تنتج من الادويه المستخدمه اثناء الجراحه والادويه الموصوفه .قد تحتاج ردود الافعال للحساسيه الى علاج اضافى .

جلطة دموية بالأوردة- تظهر الجلطات الدموية بالأوردة وفي هذه الحالة تكون الأوردة أشبه بالخطوط، على فترات متباعدة في منطقة الصدر ولكنها تشفى بدون علاج طبي أو جراحي .

الألم- قد تظهر الأم تتباين في شدتها ومدتها وتستمر بعد جراحة زرع أعضاء الصدر قد يكون الألم نتيجة أن حجم العضو المزروع غير مناسب أو المكان أو الأسلوب الجراحي أو تدبيس وشد الصدر أو احتباس العصب الحسي أو الإصابة .

مزيد من المعلومات والنصائح عن أعضاء الصدر المزروعة :

سرطان الصدر- لم تبين المعلومات الطبية الحالية زيادة في مخاطر حدوث سرطان الصدر للسيدات اللاتي أجريت لهن جراحة زرع أعضاء الصدر سواء لأغراض تجميلية أو تصحيحية. نوصي جميع السيدات بأن يفحصن صدورهن بأنفسهن من فترة إلى أخرى وعمل اشعة الصدر وفقاً للتوصيات جميعة السرطان الأمريكية ، واستشاره

American Cancer Society guidelines, and seek professional care should they notice a breast lump. Care must be exercised during breast biopsy procedures to avoid damaging the breast implant.

Mammography- Breast implants may make mammography more difficult and may obscure the detection of breast cancer. Implant rupture can occur from breast compression during mammography. Inform your mammography technologist of the presence of breast implants so that appropriate mammogram studies may be obtained. Patients with capsular contracture may find mammogram techniques painful and the difficulty of breast imaging will increase with the extent of contracture. Ultrasound, specialized mammography and MRI studies may be of benefit to evaluate breast lumps and the condition of the implant(s). Because more x-ray views are necessary with specialized mammography techniques, women with breast implants will receive more radiation than women without implants who receive a normal exam. However, the benefit of the mammogram in finding cancer outweighs the risk of additional x-rays. Patients may wish to undergo a preoperative mammogram and another one after implantation to establish a baseline view of their breast tissue.

Long term results- Subsequent alterations in breast shape may occur as the result of aging, weight loss or gain, pregnancy, or other circumstances not related to augmentation mammaplasty. Breast sagging may normally occur.

المتخصصين إذا لاحظنا وجود تورم في الصدر. يجب الحرس عند إجراء أخذ عينات من الصدر، وذلك لعدم إتلاف الأعضاء المزروعة بالصدر .

أشعة الصدر- قد تعرقل الأعضاء المزروعة بالصدر صور أشعة الصدر وتحول دون التعرف على سرطان الصدر . يمكن أن يحدث تمزق للأعضاء المزروعة بسبب الضغط على الصدر أثناء التصوير بالأشعة اخبري الفني الخاص بتصوير الأشعة عن وجود أعضاء مزروعة بالصدر وذلك حتى يمكن عمل دراسة لرسم الصدر. المرضى اللاتي لديهم تيبس وشد في الصدر قد يجدن أن اساليب رسم الصدر مؤلمة وأن صعوبة تصوير بتزداد مع زيادة الشد والتيبس. قد تفيد دراسات أشعة الرنين المغنطيسي والموجات الصوتية وأشعة الصدر، في تقييم تورمات الصدر وحالة الأعضاء المزروعة . لأنه من الضروري عمل مزيد من صور أشعة اكس بأساليب تصوير الصدر المتخصصة، وسوف تتلقى السيدات اللاتي لديهن أعضاء مزروعة الصدر أشعة أكثر من السيدات بدون هذه الأعضاء حيث يجري لهن فحص عادي. ومع ذلك، فإن فائدة رسم الصدر لتعرف على السرطان تفوق مخاطر اشعه اكس الإضافية. قد يرغب المرضى في عمل رسم صدر وقائي وآخر بعد زراعة الأعضاء للوقوف على حالة أنسجة الصدر لديهم .

نتائج على المدى الطويل- قد تحدث تغيرات في شكل الصدر بسبب التقدم في العمر، أو زيادة أو فقدان الوزن، أو الحمل أو أي ظروف أخرى تتعلق بتكبير حجم الصدر. قد تحدث ترهلات في الصدر وهو أمر عادي .

Unsatisfactory result- You may be disappointed with the results of surgery. Asymmetry in implant placement, displacement, nipple location, unanticipated breast shape and size may occur after surgery. Breast size may be incorrect. Unsatisfactory surgical scar location may occur. It may be necessary to perform additional surgery to improve your results or remove implants.

Removal / replacement of breast implants- Future revision, removal, or replacement of breast implants and the surrounding scar tissue envelope involves surgical procedures with risks and potential complications. There may be an unacceptable appearance of the breasts following removal of the implant.

Capsule procedures- Closed capsulotomy, the process of forcefully squeezing the fibrous capsule around a breast implant to break up scarring is not recommended. This may result in rupture of the breast implant or other complications.

Immune system diseases and unknown risks- A small number of women with breast implants have reported symptoms similar to those of known diseases of the immune system, such as systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, scleroderma, and other arthritis-like conditions. To date, after several large epidemiological studies of women with and without implants, there is no scientific evidence that women with either silicone gel-filled or saline-filled breast implants have an increased risk of these diseases. These diseases appear no more common in women with implants than those women without implants. The effects of breast

نتائج غير مرضية- وقد تصابي بخيبة الأمل بسبب الجراحة قد يحدث عدم تماثل في مكان العضو المزروع، أو تحرك العضو من مكانه، أو موقع الحلمة، أو شكل الصدر غير المتوقع مسبقاً وكذلك حجمه بعد الجراحة. قد يحدث خلل في حجم الصدر. قد تحدث ندب غير مرضية بعد الجراحة. قد يكون من الضروري إجراء جراحة إضافية لتحسين النتائج لديك أو إزالة الأعضاء المزروعة .

إزالة / إعادة وضع الأعضاء المزروعة بالصدر- هناك مخاطر ومضاعفات محتملة تحيط بالإجراءات الجراحية من حيث ضرورة عمل مراجعة في المستقبل، أو إزالة أو إعادة وضع الأعضاء المزروعة بالصدر وعلاج الأنسجة التي بها ندب حول مناطق زراعة الأعضاء. قد يكون هناك مظهر غير مقبول للصدر بعد إزالة الأعضاء المزروعة .

علاج التورمات- لا نوصي بإجراء عملية الضغط القصوى للتورمات المتليفة حول الأعضاء المزروعة للقضاء على الندب . لأن ذلك قد يؤدي إلى تمزق الأعضاء المزروعة بالصدر أو مضاعفات أخرى .

أمراض الجهاز المناعي ومخاطر غير معروفة- عدد قليل من السيدات اللاتي لديهن أعضاء مزروعة بالصدر، حدثت لهن أعراض مشابهة لأمراض الجهاز المناعي المعروفة مثل مهاجمة الجهاز المناعي للأعضاء السليمة بالخطأ لكونها أجسام غريبة، والتهابات المفاصل الدائمة وتيبس وشد دائم في الجلد والأنسجة المتصلة به وحالات أخرى مثل التهاب المفاصل. حتى اليوم، وبعد إجراء عدد كبير من دراسات هذه الحالات على سيدات لديهن أعضاء مزروعة وأخريات ليس لديهن أعضاء مزروعة من النوع السليكون الملى بالجل أو السليكون الملى بإطار الملح المعقم، قد زادت لديهن مخاطر حدوث أي من هذه الأمراض لم يبدو شيع هذه الأمراض في اسيدات ذات الأعضاء المزروعة عن السيدات

implants in individuals with pre-existing immune system and connective-tissue disorders are unknown. There is the possibility of unknown risks associated with silicone breast implants and tissue expanders.

"Patient safety is our first and foremost responsibility. Breast implant-associated (BIA) anaplastic large cell lymphoma (ALCL) is a T-cell lymphoma that can rarely happen when there is a delayed fluid collection (seroma) around the implant capsule. Delayed seromas, longer than 1 year after implantation, occur in approximately 0.1 to 0.2 percent of patients. Surgical ablation with explantation and capsulectomy is frequently curative."

ADDITIONAL SURGERY NECESSARY

Should complications occur, additional surgery or other treatments may be necessary. Even though risks and complications occur infrequently, the risks cited are particularly associated with augmentation mammoplasty; other complications and risks can occur but are even more uncommon. The practice of medicine and surgery is not an exact science. Although good results are expected, there is no guarantee or warranty expressed or implied on the results that may be obtained.

factors unlikely to change or be totally corrected after your breast augmentation

After we do your augmentation, you'll wear out the mirror. What you see here is real, and what I'm about to tell you is real.

بدون هذه الأعضاء. لا يعرف تأثير من لديهم اضطرابات في الجهاز المناعي أو الأنسجة المتصلة بهن على من لديهم أعضاء مزروعة بالصدر. كما أن هناك احتمال حدوث مخاطر غير معروفة متعلقة بأعضاء الصدر المزروعة من السيلكون ووسائل تمديد الأنسجة .

سلامة المرضى هي مسؤوليتنا الأولى والأهم. سرطان الغدد الليمفاوية بالخلايا الكبيرة المصاحبة لزرع الثدي (BIA) هو سرطان الغدد الليمفاوية بالخلايا التائية الذي نادراً ما يحدث عندما يكون هناك مجموعة سائلة متأخرة (ALCL) حول كبسولة الزرع. تحدث الأمصال المتأخرة ، التي تستغرق أكثر من سنة بعد الزرع ، في حوالي 0.1 إلى 0.2 في المئة من المرضى. الاستئصال الجراحي مع الاستئصال واستئصال المحفظه هو في كثير من الأحيان علاجي .

جراحة إضافية ضرورية :

عند حدوث مضاعفات، قد يكون من الضروري إجراء جراحة إضافية أو علاج آخر على الرغم من قلة حدوث المخاطر والمضاعفات، فإن المخاطر المذكورة ترتبط بجراحة تكبير حجم الصدر، يمكن أن تحدث مخاطر ومضاعفات أخرى ولكنها غير شائعة أيضاً . لم يتوصل العلم إلى كل ما يتعلق بالتداوي والجراحة. على الرغم من توقع نتائج جيدة لا يوجد هناك ضمان صريح أو مستتر عن نتائج التي قد تحدث .

العوامل التي لا يمكن تغييرها أو تصحيحها كلياً بعد جراحة تكبير حجم صدرك بعد الإنتهاء من تكبير الصدر انظري بتأمل في المرأة. ما تراه أمامك حقيقي والذي أنا على وشك أن أخبركي به حقيقي .

No woman on earth has two breasts that are the same size or same shape, and no surgeon on earth can make two breasts the same size or shape, regardless of what a surgeon may tell you. No breast augmentation surgeon can equalize the tissues of the two breasts with breast implants, and therefore cannot make breasts match. All any surgeon can do is make your breasts larger. Many patients and surgeons believe that putting a larger implant or more fill in the smaller breast can make it match the larger breast. The smaller breast, by definition, has less skin, less fat, less muscle & bone. If you attempt to put more fill than the skin can accommodate, the excess fill can produce excessive upper bulging in the breast and create a SHAPE difference between the breasts that is more apparent than a SIZE difference which every woman has. The key is to try to maintain similar appearing breast SHAPE on the two sides, understanding that it is IMPOSSIBLE to make breasts match in either size or shape. the two sides, understanding that it is IMPOSSIBLE to make breasts match in either size or shape.

Left or Right Breast Larger- Breast will never match, and different size or fill implants will not make them match:

You'll notice that one breast is higher on your chest than the other, just like every other woman. **We don't move the breasts up or down on your chest when we do your augmentation...**we just make them fuller and bigger.

Left or Right Breast is higher on chest- Breast levels on the chest will never match on two sides:

Because your breasts are at different levels on your chest, your nipples are at different levels, just like most women, and because

لا توجد سيدة على وجه الأرض لديها ثديان متماثلان في الحجم أو الشكل ولا يوجد جراح على وجه الأرض يستطيع أن يجعل حجم وشكل الثديين متماثلان مهما أخبرك الطبيب الجراح. لا يستطيع جراح تكبير صدر أن يجعل أنسجة الثديين متماثلتين باستخدام أعضاء الصدر المزروعة. ولذلك لا يستطيع أن يساوي بين الثديين. الذي يستطيع فعله أي جراح هو تكبير صدرك. الكثير من المرضى والجراحين يعتقدون أن زرع عضو أكبر أو مواد مالئة أكثر في الثدي الأصغر يمكن أن نجعله مساوي لثدي الأكبر، الثدي الأصغر، بالتحديد، جلده أقل، والدهون فيه أقل، والعظام والعضلات أقل. إذا حاولت أن تضع مواد مالئة أكثر من التي يستطيع استيعابها الجلد، فإن الزيادة في المواد المألئة سوف تبرز في الجزء العلوي من الثدي فيظهر شكلاً مختلف بين الثديين وهذا يكون ظاهر أكثر من الاختلاف في الحجم الطبيعي لدى أي سيدة. الأساس هو محاولة الحفاظ على أن يكون شكل الثديين متشابهين على كلا الجانبين مع العلم أنه من المستحيل جعل الثديين متماثلين سواء في الحجم أو الشكل.

سواء الثدي الأيمن أو الأيسر أكبر- فلن يكون الثديان متماثلان أبداً، ولن تجعل الأعضاء المزروعة بالمواد المألئة الثديين متماثلين ويظل الحجم مختلف :

ستلاحظ أن أحد الثديين أعلى في الصدر عن الآخر تماماً مثل كل سيدة. نحن لا نحرك الثديين إلى أعلى أو أسفل صدرك عندما نقوم بتكبير الصدر، نحن نملاهما ونكبرهما فقط.

سواء كان الثدي الأيمن أو الأيسر أعلى الصدر- فإن مستوى الثديين على الصدر لن يكون واحداً على الناحيتين :

نظراً لأن مستويات ثدييك مختلفان على صدرك، فإن الحلمات يكونا أيضاً على مستويات مختلفة، مثل معظم السيدات، وبسبب ذلك فإن مستويات حلماتك لن تتساوى على كلا الجانبين.

إذا نظرت الى وضع الحلمه على الجزء المستدير المحيط بالحلمه في الصدر على كلا

of that, your nipple LEVELS will not match on the two sides.

If you look at the nipple position on the breast mound on both sides, it's always different on the two sides. When we do an augmentation, we don't move the nipple, we just enlarge the breast. So when you look at your nipple positions on your breast mound after augmentation, they will always be different on the two sides.

left or right nipple-areola higher on chest- nipple levels will never match on two sides:

nipple position on the breast mounds is different on the two sides **nipple position and direction will never match on the two sides.**

Remember, your breasts aren't at the same height on your chest. So the folds under your breast won't be at the same height after we augment your breasts. One will always appear higher to you, and the other will appear lower.

Left or Right fold beneath breast higher on chest- The level of Breast on the chest will not match on two sides:

The position of entire breast on the chest wall will not change. If one fold beneath the breast is lower than the other, it will also be lower after augmentation.

In the gap that you see between your breasts, there is nothing but skin and thin fat covering your breastbone. If we move the edges of your implants toward the middle to narrow the gap between your breasts, the edge of the implant, under this thin skin, may become visible. When the weight of the implant pulls on the thin skin, you may see visible rippling and implant edges in the cleavage gap...a very

الجانبيين، ستجد ان هناك اختلاف دائما بين الجنبيين. لن يكون وضع واتجاه الحلمات متساوى ابدا على الجنبيين .

عندما نقوم بالتكبير، فلا نحرك الحلمات، فنحن نقوم بتكبير الصدر فقط . ولذلك عندما نتظري إلى وضع الحلمات على مكانها في الصدر بعد التكبير، سيكونان دائما مختلفان على الجنبيين .

تذكرى، أن ثدييك ليس على نفس الارتفاع في صدرك وكذلك فإن الثنيات أسفل الصدر لن تكون بنفس الارتفاع بعد تكبير صدرك سيبدو دائما لك أن أحد الثديين أعلى من الآخر ، والآخر يبدو منخفض .

سواء كانت الثنيات اليمنى أو اليسرى أسفل الصدر أعلى عن بعضهما – إن مستوى الثديين على الصدر لن يكون متساو على الجنبيين .

لن يتغير وضع الثديين الكلي على أجناب الصدر إذا كانت احدى الثنيات أسفل الصدر منخفضة عن الأخرى، فستظل كذلك بعد التكبير .

في الفراغ بين الثديين لا يوجد شيء الا الجلد وشحم خفيف يغطي عظم الصدر إذا قمنا بتحريك حواف الأعضاء المزروعة نحو وسط الصدر لتضييق فجوة الصدر، فإن حافة العضو المزروع، تحت الجلد الرقيق، قد تصبح مرئية. عندما يزداد وزن العضو المزروع على الجلد الرقيق فقد ترى بوضوح ترهل وحواف العضو المزروع في الفجوة بين الثديين، وهو مظهر غير مرغوب فيه، و غالبا ما يكون تشوه لا يمكن اصلاحه . ونتيجة لذلك ، إذا كنت لا

unattractive appearance, AND OFTEN AN UNCORRECTABLE DEFORMITY. As a result, if you don't want these problems, we can only fill your breast, and when you want to narrow the gap, USE A BRA. BRAS CAN SAFELY NARROW YOUR CLEAVAGE, SURGERY CAN'T. Your gap will be similar to what it is now, but your breasts will be fuller and you should be able to narrow the gap better by pushing the breasts inward with a bra.

The gap between breasts will be similar to what it is now in order to avoid risks of visible implant edges and traction rippling in the cleavage area, both of which can be uncorrectable.

Your implants rest on a foundation that is your chest wall. Every woman's chest wall is different on the two sides. We don't change the chest wall foundation when we do your augmentation. So your implants will rest on different foundations, and you will see differences in your breasts as a result.

Chest wall differences exist on the two sides of chest that will not be corrected and will affect breast shape differently on the two sides.

Breast implants predictably enlarge your breasts. To some extent, they may affect shape of your breast in certain areas, more with some implants compared to others. But you should clearly understand that your own breast tissue and envelope that rest on top of the implant won't change, and you will see them first. Breast implants, therefore, only enlarge what you have. They can make your shape dramatically different, and they can't

تريدون هذه المشاكل يمكننا ملئ صدرك فقط وعندما ترغبين في تضيق الفجوة ارتدي حامل الصدر (ستيان). لأن حامل الصدر يمكن أن يضيق الفجوة بأمان، ولكن الجراحة لا تستطيع ذلك. ستكون الفجوة لديك مشابه لما هي عليه الآن، ولكن ثدييك سيكونان ممتلآن أكثر ويمكنك تضيق الفجوة بدفع الثديين إلى الداخل باستخدام حامل الصدر (ستيان).

ستكون الفجوة بين الثديين مشابه لما هو عليه الآن وذلك لتفادي أي مخاطر بروز حواف الأعضاء المزروعة وتدلي وترهل الثديين في الفجوة بينهما، وهاتين الحالتين لا يمكن إصلاحهما.

ترتكز الأعضاء المزروعة على أساس وهو أجانب الصدر (حائط الصدر). يختلف حائط الصدر لدى كل سيدة على الأجانب. نحن لا نغير أساس حائط الصدر عندما نجري التكبير ولذلك فإن الأعضاء المزروعة سوف تتركز على أسس مختلفة وسوف تری اختلافات في ثدييك نتيجة لذلك.

توجد اختلافات حائط الصدر على جانبي الصدر، وهذا الوضع لا يمكن تصحيحه وسوف يؤثر على شكل وسوف يجعل شكل الثديين مختلف على الجانبين.

من المفترض أن تعمل الأعضاء المزروعة على تكبير صدرك إلى حد ما، سوف تؤثر على شكل صدرك في مناطق معينة ويختلف هذا التأثير حسب نوع الأعضاء المزروعة ولكن يجب عليك أن تفهمي بوضوح أن أنسجة صدرك والغلاف الذي يتركز أعلى العضو المزروع لن يتغير، وسوف يكون بإمكانك رؤيتهما أولاً.

إن الأعضاء المزروعة مع ذلك، تكبر ما لديك فقط. يمكن أن تجعل شكلك مختلف تماماً ولا يمكن التنبؤ بأنها قد تؤدي إلى عتدال شكل ثدييك.

predictably make shape adjustments in your breasts.

The basic shape and configuration of breasts will be similar to their current appearance and not change drastically, but will be larger. Breast implants cannot predictably make precise shape changes in breasts

Surgeon and you cannot change how wide your breasts are, and we can't change how much your tissue stretches. The width of your breast, and the amount of skin stretch determine how much fill we MUST put in your breast to get an optimal result. Imagine that we have a funnel at the top, and we pour fluid into your breast. The bottom will fill first, until the skin reaches its limits of stretch forward. Then the middle will fill. If we stop there, you'll still have an empty upper breast. If we continue pouring, the upper breast will fill until the breast looks perfect. We'll fill even past that point, because we know when the lower breast stretches after we add the weight of an implant, we'll need a bit more fill to keep the upper breast filled. **NO MATTER WHAT, YOU SHOULD KNOW THAT YOU'LL LOSE SOME UPPER BREAST FILL OVER TIME AS YOU AGE, AND NO IMPLANT CAN PREVENT THAT.**

Due to the width of my breasts and the stretch of my tissues, a significant amount of volume is required to just fill my breasts to a level that will not leave me with an empty upper breast. My tissues have already shown that they stretch, so they may not support the amount of volume

إن الشكل الأساسي ومحيط الثدي سيكونان متشابهان للشكل الحالي ولن يحدث تغير جزئي، ولكن سيكونان أكبر لا يمكن التنبؤ أن الاعضاء المزروعة بالصدر سوف تؤدي إلى تغيرات دقيقة في شكل الثدي .

لا يمكن لك أو للجراح تغير عرض الثديين، ولا يمكننا تغير كمية الأنسجة المعرضة للشد لديك أن عرض صدرك، وكم الشد في الجلد يقران كمية المواد المألثة التي يجب أن نضعها في صدرك للحصول على أفضل النتائج . تخيلي أن لديك قمع للأعلى ونحن نصب سائل فيه إلى داخل صدرك فإن القاع سيمتلأ أولاً حتى يأخذ الجلد حدود إمتلائه ويتمدد إلى الأمام ثم يمتلأ الوسط إذا توقفنا عند هذا الحد فسوف تكون المنطقة العليا من الصدر فارغة. وإذا تابعنا الصب، فإن الجزء العلوي من الصدر سيمتلأ ويبدو في حالة ممتازة. وسوف نملاً حتى المنطقة الأمامية لأننا نعرف أن عندما يتمدد الجزء السفلي من الصدر بعد ان نزيد الوزن بالاعضاء المزروعة سوف نحتاج أن نملاً أكثر ليكون الجزء العلوي من الصدر مملوء. مهما كان الأمر، لا بد أن تعلمي أنك ستفتقدي بعض من المواد المألثة الموجودة أعلى الصدر مع مرور الوقت والتقدم في السن، ولا يمكن لأي عضو يزرع أن يمنع ذلك .

بسبب عرض صدري وتمدد أنسجتي، ليكون مطلوب كمية حجمها كبير لملئ صدري إلى المستوى الذي لا يترك مكان فارغ أعلى الصدر. لقد تبين أن أنسجتي تتمدد ولذلك فإن كم الدعم المطلوب قد لا يفي بالغرض، وقد يحدث لي زيادة أو نقصان في التمدد مستقبلاً، بنفس المخاطر المذكورة في الفقرة عاليه .

required to get a good result, and I may have excessive stretching or thinning in the future, with the same risks as listed in the previous item above.

We discussed previously that breast implants, regardless of their shape, size, or design, cannot predictably control the shape of your breasts. If some surgeons tell you that they can predictably control specific areas of your breast shape, especially for more than 5 years, ask for them to write you a guarantee. Truthful, knowledgeable, experienced surgeons know that they cannot do that. **DON'T BE FOOLED BY PROMISES OF PREDICTABLE MINOR CHANGES. THE BEST SURGEONS NEVER MAKE YOU THOSE PROMISES, BECAUSE THEY KNOW THAT IT IS IMPOSSIBLE TO DELIVER THEM.**

Breast implants cannot predictably control the specific SHAPE of my breasts or areas of my breasts, so **IF I CHOOSE TO HAVE BREAST AUGMETNATION, ALL I SHOULD PREDICTABLY EXPECT IS AN INCREASE IN THE SIZE OF MY BREASTS.**

Dr.

_____ has reviewed my condition with me in detail. I have seen, understand, and accept each of the factors listed above that will not change or may be only partially improved following my augmentation. I totally understand and accept that my breasts or components of my breasts **WILL NEVER MATCH ON THE TWO SIDES**, and that perfection is not an option, and I only expect an **INCREASE IN THE SIZE** of my breasts.

لقد ناقشنا من قبل أعضاء الصدر المزروعة بغض النظر عن شكلها أو حجمها أو تصميمها، إنه لا يمكن التنبؤ بشكل صدرك . إذا أخبرك بعض الجراحين بأنه يمكنهم التنبؤ.

بالتحكم في شكل مناطق معينة بالصدر، خاصة مدة تزيد عن 5 سنوات، اطلبي منهم ضمانه مكتوبة. إن الجراحين اصحاب الخبرة والمعلومات والموثوق بهم يعلمون أنهم لا يستطيعون ذلك . لا تتخذي بالوعد بأنه يمكن التنبؤ بتغيرات صغيرة. الجراحين الممتازين لا يمكن أبداً أن يعدوا بذلك لأنهم يعلمون أنه لا يمكن الوفاء بهذه الوعد .

لا يمكن التنبؤ بشكل محدد سيكون عليه صدري أو مناطق معينة في الصدر بعد وضع الأعضاء المزروعة، ولذلك عندما نقرر تكبير الصدر فإن كل ما يمكن توقعه مقدماً هو زيادة في حجم صدري .

دكتور / راجع حالتي معي بالتفصيل لقد رايت، وتفهمت وأقبل كل عنصر مذكور أعلاه، إنه لن يتم تغير، وقد يكون تحسن جزئي فقط بعد التكبير. إنني أفهم تماماً وأتقبل أن صدري وعناصر صدري لن تكون أبداً متماثلتين على كلا الجانبين، وإنني أتقبل الاختلاف، وأتوقع فقط زيادة في حجم صدري .

FINANCIAL RESPONSIBILITIES

The cost of surgery involves several charges for the services provided. The total includes fees charged by your doctor, the cost of implants and surgical supplies, anesthesia and hospital charges, depending on where the surgery is performed. Depending on whether the cost of surgery is covered by an insurance plan, you will be responsible for necessary co-payments, deductibles, and charges not covered. **Additional costs may occur should complications develop from the surgery. Secondary surgery or hospital day-surgery charges involved with reversionary surgery would also be your responsibility.**

الالتزامات المالية :

تتضمن تكاليف الجراحة عدة مصاريف عن الخدمات المقدمة يشمل الاجمالي أتعاب الطبيب، ثمن الاعضاء المزروعة وأدوات الجراحة، التخدير، مصاريف المستشفى حسب مكان إجراء الجراحة. سواء كان التأمين يغطي نفقات الجراحة أم لا أو تكون مسئوليتك تسديد كافة المصاريف والمستقطعات والمبالغ التي لم يشملها التأمين .

قد يكون هناك نفقات إضافة اذا حدثت مضاعفات بعد الجراحة وستكون مسئول أيضاً عن تسبير نفقات الجراحة الفرعية أو جراحة يوم في المستشفى أو الجراحة التأكيدي للمراجعة .

توقيع المريض
التاريخ

Patient's Signature
date

DISCLAIMER

Informed-consent documents are used to communicate information about the proposed surgical treatment of a disease or condition along with disclosure of risks and alternative forms of treatment(s). The informed BREAST AUGMENTATION MAMMAPLASTY, continued consent process attempts to define principles of risk disclosure that should generally meet the needs of most patients in most circumstances.

However, informed consent documents should not be considered all inclusive in defining other methods of care and risks encountered. Your plastic surgeon may provide you with additional or different information which is based on all the facts in your particular case and the state of

مسئولية المريض وحده بعد الموافقة

نستعمل مستندات الموافقة بالعلم لتوصيل المعلومات عن العلاج الجراحي المقترح لمرضى أو حالة معينة بالإضافة إلى إيضاح المخاطر ونماذج العلاج البديلة . إن إجراءات الموافقة على جراحة تكبير الصدر تقوم على محاولات تحديد مبادئ ايضاح المخاطر التي يود معظم المرضى فهمها في معظم الظروف . ومع ذلك ، لا يجب الأخذ في الاعتبار إن مستندات الموافقة بالعمل تشمل وتحدد جميع وسائل الرعاية الأخرى والمخاطر التي يتعرض لها المريض ، قد يقدم لك معلومات إضافية أو مختلفة تحتوي على الحقائق كاملة الخاصة بحالتك والمعلومات الطبية اللازمة لك.

تقوم مستندات الموافقة بالعلم على تحديد أو تقديم مستوى معين من الرعاية الطبية. فإن معيار الرعاية الطبية يتوقف على حالة كل مريض والظروف الحقيقية الخاصة به ، وتخضع للتغير لأن التكنولوجيا والعلم يتقدمان فيحدث تطور في الأساليب العلمية.

medical knowledge. Informed-consent documents are not intended to define or serve as the standard of medical care. Standards of medical care are determined on the basis of all of the facts involved in an individual case and are subject to change as scientific knowledge and technology advance and as practice patterns evolve.

We remind you that all cosmetic surgery carries a risk, has limitations which could include disappointment with the results. You should agree about the anticipated outcome of your surgery and concur about your expectations of the results

You should discuss alternative treatments and thoroughly understand the risk of the procedures.

It is important that you read the above information carefully and have all of your questions answered before signing the consent

نحن نذكرك بأن جميع عمليات جراحة التجميل لها مخاطرها ، ولها حدودها والتي قد تشمل خيبة الأمل في النتائج. يجب عليك الموافقة على نتائج الجراحة مقدما وعلى النتائج المتوقعة. يجب عليك مناقشة وسائل العلاج البديلة وأن تتفهمي بدقة مخاطر الإجراءات من المهم أن تقرأ أي المعلومات عاليه بعناية وأن تحسلي على إجابات لأسئلتك قبل التوقيع بالموافقة.

CONSENT FOR SURGERY, PROCEDURE or TREATMENT

1. I hereby authorize Dr. _____ and such assistants as may be selected to perform the following procedure or treatment: **BREAST AUGMENTATION MAMMAPLASTY.**
2. I recognize that during the course of the operation and medical treatment or anesthesia, unforeseen conditions may necessitate different procedures than those above. I therefore authorize the above physician and assistants or designees to perform such other procedures that are in the exercise of his or her professional judgment necessary and desirable. The authority granted under this paragraph shall include all conditions that require treatment and are not known to my physician at the time the procedure is begun.

3. I consent to the administration of such anesthetics considered necessary or advisable. I understand that all forms of anesthesia involves risk and the possibility of complications, injury, and sometimes death.
4. I acknowledge that no guarantee has been given by anyone as to the results that may be obtained.
5. I consent to the disposal of any tissue, medical devices or body parts which may be removed.
6. I acknowledge that I or my duly authorized representative filled up the Patient Medical History and all information given is true.
7. I have disclosed all of the medications, supplements and herbal remedies I take on a regular or incidental to the doctor in charge of the procedure.
8. I understand that I am required to refrain from taking the Medications to Avoid (Chapter 6) 2 weeks prior to surgery. Should I take any of the medications, supplements or herbal remedies I am instructed to avoid, it is my obligation to notify the doctor. I fully understand that my surgery may have to be rescheduled or postponed in the event that I have not complied with these medication restrictions listed.
9. I understand that it is my responsibility to obtain clearance from the prescribing physician before I stop taking any of my regularly prescribed medications.
10. I have received the following forms: Information on the Procedure, Instructions Prior to Surgery, Medications to Avoid, Pre-operative Protocol, Surgical Facility, Operation Day Protocol and Post-operative Instructions.
11. I acknowledge that I agree to the terms and conditions listed in the Booking Procedure, Financial Agreement and Consent for Clinical Photographs and Documents.
12. I consent that the procedure/treatment, alternative procedures or methods of treatment and risks to the procedure has been explained to me in the way that I understand.

IMPLANT SIZE -

IMPLANT PLACEMENT –

I hereby sign that I read & understand all the consent form.

I CONSENT TO THE TREATMENT OR PROCEDURE AND THE ABOVE LISTED ITEMS (1-12).

File Number: _____ Date: _____

Patient's Full Name: _____ Patient's Signature: _____

Witness: _____ Date: _____

Signature over Printed Name

DR. _____ Date: _____

Signature over Printed Name

موافقة على الجراحة، الإجراءات أو العلاج

- 1- انا افوض بموجب هذا الدكتور _____ والمساعدين الذين قد يتم اختيارهم لاداء جراحة زرع عورفعالصدر.
- 2- انى ادرك انه اثناء اجراء الجراحه والعلاج الطبى او التخدير، قد تكون هناك ضرورة لعمل اجراءات مختلفة عن المنصوص عليها عليه بسبب ظهور حالات لم تكن متوقعة. ولذلك فانا افوض الطبيب المذكور عليه ومساعديه او المعنيين للقيام بمثل هذه الاجراءات التى هى ضمن تخصصه او تخصصها وبرأها او تراها ضرورية .
- 3- يشمل التفويض المنصوص عليه فى هذه الفقرة كافة الحالات التى تتطلب علاج وليست معروفة لطبيبى فى الوقت الذى يتم فيه هذا الاجراء. اوافق على اجراء التخدير الذى يعتبر ضرورى او ينصح به .انى اتفهم ان جميع اشكال التخدير لها مخاطرها مضاعفتها المحتمله،والاصابة،احياناً الموت .
- 4- اقر بأنه لم يتم اعطاء ضمانات حول النتائج التى قد تحدث .
- 5- اوافق على التخلص من اى انسجة، ادوات طبية أو اجزاء من الجسم قد يتم ازلتها .
- 6- اقر بأننى او من ينوب عنى رسمياً قد اعطى كافة المعلومات صحيحة فى استمارات تاريخ الحالة الطبية للمريض .
- 7- لقد اوضحت كافة الادوية والمكملات والاعشاب العلاجية التى اتناولها بصفة منتظمة او عارضة الى الطبيب المسئول عن الاجراء .
- 8- انى اتفهم انه مطلوب منى الامتناع عن تناول الادوية (المنصوص عليها فى الفصل السادس لتجنب....) قبل العملية بأسبوعين . وفى حالة تناولى لاي من هذه الادوية او المكملات او الاعشاب العلاجية التى لدى تعليمات يتجنبها،فانها تكون مسؤوليتى باخطار الطبيب .انى اتفهم تماماً انه قد يتم تأجيل او تحديد موعد اخر لعمليتى الجراحية ففى حالة عدم التزامى بالامتناع عن الادوية المذكورة .
- 9- انى اتفهم انها مسؤوليتى للحصول على تصريح من الطبيب المعالج قبل التوقف عن تناول الادوية الموصوفة لى يتناولها بانتظام .
- 10- لقد تسلمت النماذج الاتية :معلومات عن الاجراء، تعليمات ما قبل الجراحة، الادوية التى يجب تجنبها،بروتكول (شكليات) ما قبل الجراحة،التسهيلات الجراحية،بروتكول (شكليات) يوم العملية وتعليمات ما بعد العملية.
- 11- اقر بالموافقة على البنود والشروط المذكورة فى كتيب الاجراءات ، والاتفاقية المالية والموافقة على المستندات والصور الخاصة بالعيادة.
- 12 -اقر بان الاجراء / العلاج، الاجراءات البديلة او سبل العلاج ومخاطر الاجراء قد تم شرحها لى بالطريقة التى افهمها.

13- حجم الزرع :

14- الزرع :

وافق على العلاج والاجراء والبنود المذكورة عليه (1-12).

رقم الملف	تاريخ
اسم المريض كاملاً	توقيع المريض
شاهد	تاريخ
التوقيع على الاسم المطبوع	
الدكتور	تاريخ
التوقيع على الاسم المطبوع	

