

INFORMED CONSENT – GYNECOMASTIA SURGERY

INSTRUCTIONS

This is an informed-consent document that has been prepared to help inform you concerning gynecomastia (male breast reduction) surgery, its risks, as well as alternative treatment(s). It is important that you read this information carefully and completely. Please initial each page, indicating that you have read the page and sign the consent for surgery as proposed by your plastic surgeon and agreed upon by you.

GENERAL INFORMATION

Gynecomastia surgery is a procedure to remove excess fat, glandular tissue and/or skin from overdeveloped or enlarged male breasts. In severe cases of gynecomastia, the weight of excess breast tissue may cause the breasts to sag and stretch the areola (the dark skin surrounding the nipple). In these cases, the position and size of the areola can be surgically improved and excess skin may need to be reduced, leading to additional scarring.

Gynecomastia may result from hormonal changes, heredity, disease, or the use of certain drugs, and can present unilaterally (one breast) or bilaterally (both breasts).

There are a variety of different techniques used by plastic surgeons to treat gynecomastia. There is often a more solid breast tissue under the areola that may require excision and biopsy as well as additional fatty tissue around the chest often better removed with liposuction techniques. Breast Cancer can occur in males, much less frequently than in females, but the solid tissue removed may require pathologic evaluation. Gynecomastia surgery can be combined with other forms of body-contouring surgery, including liposuction, or performed at the same time with other elective surgeries.

ALTERNATIVE TREATMENTS

Alternative forms of management consist of not undergoing the surgical procedure or wearing undergarments to help mask the appearance of large breasts. In selected patients, liposuction has been used to reduce the size of large breasts. Risks and potential complications are also associated with alternative forms of treatments.

RISKS OF GYNECOMASTIA SURGERY

Every surgical procedure involves a certain amount of risk and it is important that you understand these risks and the possible complications associated with them. In addition, every procedure has limitations. An individual's choice to undergo a surgical procedure is based on the comparison of the risk to potential benefit. Although the majority of patients do not experience these complications, you should discuss each of them with your plastic surgeon to make sure you understand all possible consequences of gynecomastia surgery.

General Risks of Surgery:

Healing Issues: Certain medical conditions, dietary supplements and medications may delay and interfere with healing. Patients with massive weight loss may have a healing delay that could result in the incisions coming apart, infection, and tissue changes resulting in the need for additional medical care, surgery, and prolonged hospitalizations. Patients with diabetes or those taking medications such as steroids on an extended basis may have prolonged healing issues. Smoking will cause a delay in the healing process, often resulting in the need for additional surgery. There are general risks associated with healing such as swelling, bleeding, and the length of surgery and anesthesia that include a longer recovery and the possibility of additional surgery, prolonged recovery, color changes, shape changes, infection, not meeting goals and expectations, and added expense to the patient.

الموافقة المستنيرة- جراحة تصحيح تضخم الثدي عند الذكور

التعليمات

لقد أعدت وثيقة الموافقة المستنيرة هذه لمساعدتك على معرفة كل ما يتعلق بجراحة تصحيح تضخم الثدي عند الذكور (جراحة تصغير الثدي عند الرجال)، ومخاطرها، وكذلك طرق العلاج البديل. لذا، فمن المهم قراءة هذه المعلومات كاملة بدقة. يرجى وضع حروف اسمك الإستهلاكية على كل صفحة، للإشارة إلى أنك قرأت الصفحة ثم وقع على الموافقة على إجراء العملية الجراحية على النحو الذي اقترحه جراح التجميل ووافقت عليه.

معلومات عامة

جراحة تصحيح تضخم الثدي عند الذكور هي عملية جراحية لإزالة الدهون الزائدة و/ أو الأنسجة الغدية و/ أو الجلد الزائد أو المتضخم عند الذكور. في حالات تضخم الثدي الشديدة، قد تؤدي زيادة أنسجة الثدي إلى ترهل الثدي وتمدد الهالة (الجلد الداكن المحيط بالحلمة). وفي هذه الحالات، يمكن تحسين وضع وحجم الهالة جراحياً وقد يتطلب الأمر إزالة الجلد الزائد، مما يتطلب حدوث ندبات إضافية. وقد يحدث تضخم الثدي عند الذكور نتيجة التغيرات الهرمونية أو عوامل وراثية أو الإصابة ببعض الأمراض أو استخدام بعض الأدوية، ويمكن أن يحدث بصورة أحادية (ثدي واحد) أو ثنائية (كلا الثديين).

هناك العديد من التقنيات المختلفة التي يستخدمها جراحو التجميل لعلاج تضخم الثدي عند الذكور. وغالباً ما يكون هناك نسيج أكثر صلابة تحت الهالة الذي قد يتطلب الاستئصال وأخذ عينة لفحصها فضلاً عن الأنسجة الدهنية الإضافية حول الصدر والتي غالباً ما يكون من الأفضل إزالتها باستخدام تقنيات شفط الدهون. قد يصاب الذكور بسرطان الثدي بمعدلات أقل بكثير من الإناث، ولكن الأنسجة الصلبة التي تمت إزالتها قد تتطلب تقييم مرضي. يمكن الجمع بين جراحة تصحيح تضخم الثدي عند الذكور وجراحات نحت الجسم الأخرى، بما في ذلك شفط الدهون، أو يتم إجراؤها في نفس الوقت مع العمليات الجراحية الانتقائية الأخرى.

الطرق العلاجية البديلة

تتشكل الأنماط البديلة للعلاج من عدم الخضوع للعمليات الجراحية أو ارتداء ملابس داخلية للمساعدة في إخفاء مظهر الثدي الكبير. في بعض حالات المرضى، يتم إجراء عملية شفط الدهون لتقليل حجم الثديين الكبيرين. وقد تحدث بعض المخاطر والمضاعفات المحتملة أيضاً مع الطرق العلاجية البديلة.

مخاطر إجراء جراحة تصحيح تضخم الثدي عند الذكور

تتطوي كل عملية جراحية على قدر معين من المخاطر، ومن المهم فهم هذه المخاطر والمضاعفات المحتملة التي تنتج عنها. بالإضافة إلى ذلك، فلكل عملية جراحية تحدياتها الخاصة. ويستند اختيار الفرد للخضوع لعملية جراحية على مقارنة المخاطر بالفوائد المحتملة. وعلى الرغم أن معظم المرضى لا يعانون من هذه المضاعفات، إلا أنه ينبغي عليك مناقشة كل واحدة منها مع جراح التجميل لتتأكد أنك على دراية بكل النتائج المحتملة لجراحة تصحيح تضخم الثدي عند الذكور.

المخاطر العامة للجراحة:

مرحلة الشفاء: قد تؤثر بعض الظروف الصحية والمكملات الغذائية والأدوية على عملية الشفاء وتأخره. فقد يعاني المرضى الذين يعانون من نقص شديد في الوزن من تأخر الشفاء مما يؤدي إلى تمزق الشقوق والإصابة بالالتهابات وتغيرات في الأنسجة مما قد يتطلب رعاية طبية إضافية أو تدخل جراحي والإقامة في المستشفيات لفترات طويلة. أما المرضى الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك الذين يتناولون الأدوية مثل المنشطات بصورة مستمرة قد يحتاجون إلى فترات طويلة حتى يتمثلوا للشفاء. سوف يتسبب التدخين في تأخير عملية الشفاء، مما يؤدي غالباً إلى الحاجة إلى إجراء جراحة إضافية. هناك مخاطر عامة مرتبطة بالشفاء مثل التورم والنزيف وطول مدة إجراء الجراحة والتخدير وذلك يحتاج لفترة نقاهة أطول أو احتمالية الخضوع لعملية جراحية إضافية وطول فترة التعافي وتغيير لون البشرة وشكلها والإصابة بالالتهابات وعدم تلبية الأهداف والتوقعات ووجود نفقات إضافية يتكبدها المريض.

كما أن المرضى الذين يعانون من ترهلات شديدة في الجلد (المرضى الذين يسعون إلى شد الوجه ورفع الثدي وشد البطن وشد الجسم) سيحصلون على نفس الجلد المترهل بعد الجراحة. ولن يتغير مظهر الجلد أو مرونته وقد يحدث ترهل للجلد مرة أخرى مستقبلاً، ولكن بمعدل أسرع قد يختلف من مريض لآخر. كما يمكن أن تتأثر الأطراف العصبية بالندوب التي تظهر أثناء الجراحة مثل استئصال الشحوم من خلال الشفط وشد البطن والوجه والجسم وجراحة الأطراف. في حين أنه قد لا يحدث إصابة بالغة في الأعصاب، فإن الأطراف العصبية الصغيرة أثناء فترة الشفاء قد تصبح نشطة للغاية مما ينتج عنه وجود منطقة مؤلمة أو شديدة الحساسية بسبب تأثر العصب الحسي الصغير بوجود النسيج الندبي. وغالباً ما يحل التذليك والتدخل غير الجراحي المبكر هذا الأمر. فمن المهم التحدث مع طبيبك عن ألم ما بعد الجراحة.

النزيف: من الممكن وعلى غير المعتاد حدوث نزيف أثناء الجراحة أو بعدها. في حالة حدوث نزيف ما بعد الجراحة، فقد يتطلب الأمر علاج طارئ لتصريف الدم المتراكم أو قد تحتاج إلى نقل دم وهذا أمر نادر الحدوث. وقد يؤدي زيادة النشاط بعد وقت قصير من الجراحة إلى زيادة فرصة حدوث نزيف وإجراء جراحة إضافية. فمن المهم اتباع تعليمات ما بعد الجراحة والحد من التمارين والنشاط الشاق خلال الوقت المحدد. لا تتناول أي أسبرين أو أدوية مضادة للالتهابات لمدة عشرة أيام على الأقل قبل الجراحة أو بعدها، لأن ذلك قد يزيد من خطر حدوث النزيف. قد تزيد "الأعشاب" والمكملات الغذائية بدون وصفة طبية من خطر حدوث النزيف أثناء الجراحة. كما يمكن أن يحدث تكتل دموي في أي وقت وعادة ما يحدث في الأسابيع الثلاثة الأولى بعد إصابة المنطقة التي أجريت بها الجراحة. إذا كانت عمليات نقل الدم ضرورية لعلاج فقد الدم فهناك خطر للإصابة بالعدوى المرتبطة بالدم مثل التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). وقد تؤدي أدوية الهيبارين المستخدمة لمنع تجلط الدم في الأوردة إلى حدوث نزيف وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

Patients with significant skin laxity (patients seeking facelifts, breast lifts, abdominoplasty, and body lifts) will continue to have the same lax skin after surgery. The quality or elasticity of skin will not change and recurrence of skin looseness will occur at some time in the future, quicker for some than others. There are nerve endings that may become involved with healing scars during surgery such as suction-assisted lipectomy, abdominoplasty, facelifts, body lifts, and extremity surgery. While there may not be a major nerve injury, the small nerve endings during the healing period may become too active producing a painful or oversensitive area due to the small sensory nerve involved with scar tissue. Often massage and early non-surgical intervention resolves this. It is important to discuss post-surgical pain with your surgeon.

Bleeding: It is possible, though unusual, to experience a bleeding episode during or after surgery. Should postoperative bleeding occur, it may require emergency treatment to drain accumulated blood or you may require a blood transfusion, though such occurrences are rare. Increased activity too soon after surgery can lead to increased chance of bleeding and additional surgery. It is important to follow postoperative instructions and limit exercise and strenuous activity for the instructed time. Do not take any aspirin or anti-inflammatory medications for at least ten days before or after surgery, as this may increase the risk of bleeding. Non-prescription “herbs” and dietary supplements can increase the risk of surgical bleeding. Hematoma can occur at any time, usually in the first three weeks following injury to the operative area. If blood transfusions are necessary to treat blood loss, there is the risk of blood-related infections such as hepatitis and HIV (AIDS). Heparin medications that are used to prevent blood clots in veins can produce bleeding and decreased blood platelets.

Infection: Subacute or chronic infections may be difficult to diagnose. Should an infection occur, treatment including antibiotics, or additional surgery may be necessary. Individuals with an active infection in their body or should not undergo surgery. Although infection is unusual after this type of surgery, it may appear in the immediate post-operative period or at any time after surgery. It is important to tell your surgeon of any other infections, such as ingrown toenail, insect bite, or urinary tract infection. Remote infections, infections in other parts of the body, may lead to an infection in the operated area.

Scarring: All surgery leaves scars, some more visible than others. Although good wound healing after a surgical procedure is expected, abnormal scars may occur within the skin and deeper tissues. Scars may be unattractive and of different color than the surrounding skin tone. Scar appearance may also vary within the same scar. Scars may be asymmetrical (appear different on the right and left side of the body). There is the possibility of visible marks in the skin from sutures. In some cases scars may require surgical revision or treatment.

Firmness: Excessive firmness can occur after surgery due to internal scarring. The occurrence of this is not predictable. Additional treatment including surgery may be necessary.

Change in Nipple and Skin Sensation: You may experience a diminished (or loss) of sensitivity of the nipples and the skin of your breast. After several months, most patients have normal sensation. Partial or permanent loss of nipple and skin sensation may occur occasionally. Changes in sensation may affect sexual response. In rare circumstances the nipple may be lost entirely.

Skin Contour Irregularities: Contour and shape irregularities may occur. Visible and palpable wrinkling of skin may occur. Residual skin irregularities at the ends of the incisions or “dog ears” are always a possibility when there is excessive redundant skin. This may improve with time, or it can be surgically corrected.

الالتهابات: قد يكون من الصعب تشخيص الالتهابات شبه الحادة أو المزمنة. في حالة الإصابة بالالتهابات، فقد يكون من الضروري اتباع طرق العلاج المناسبة بما في ذلك تناول المضادات الحيوية أو إجراء جراحة إضافية. يجب على المصابين بأي التهابات نشطة في أجسامهم عدم الخضوع لأي عملية جراحية. على الرغم من أن الإصابة بالالتهابات غير واردة بعد هذا النوع من الجراحة، فربما تظهر في فترة ما بعد الجراحة مباشرة أو في أي وقت بعد الجراحة. لذلك من الضروري إبلاغ طبيبك الجراح عن أي التهابات أخرى مثل الظفر الغائر أو لدغة الحشرات أو التهابات المسالك البولية. قد تؤدي الالتهابات البسيطة والالتهابات في أجزاء أخرى من الجسم إلى الإصابة في منطقة الجراحة.

التندب: تترك جميع العمليات الجراحية ندوباً، بعضها أكثر وضوحاً من البعض الآخر. على الرغم من توقع التئام الجروح بشكل جيد بعد إجراء العملية الجراحية، فقد يحدث ندوب غير طبيعية داخل الجلد والأنسجة العميقة. وقد تترك الندوب مظهراً سيئاً ذات لون مختلف عن لون الجلد المحيط. قد يختلف أيضاً مظهر الندبة عن الندبة المشابهة. وقد تكون الندبات غير متناظرة (تبدو مختلفة على الجانب الأيمن منها في الجانب الأيسر من الجسم). هناك احتمال ظهور علامات مرئية في الجلد نتيجة لخياطة الجرح. في بعض الحالات، قد تتطلب الندوب تدخلاً جراحياً أو علاجاً.

التصلب: قد يحدث تصلب شديد بعد الجراحة بسبب الندوب الداخلية. ولا يمكن التنبؤ بحدوث ذلك. وقد يكون العلاج الإضافي بما في ذلك التدخل الجراحي ضرورياً.

تغير في الإحساس بالحلمة والجلد: قد يعاني المريض من نقص (أو فقد) الإحساس بحلمتي وجلد الثدي. وبعد عدة أشهر، يشعر معظم المرضى بإحساس طبيعي بهما. وقد يحدث أحياناً فقد جزئي أو دائم للإحساس بالحلمة والجلد. وربما تؤثر التغييرات في الإحساس على الاستجابة الجنسية. وفي حالات نادرة، قد تفقد الحلمة تماماً.

شكل الجلد غير المنتظم: قد يحدث عدم انتظام في مظهر وشكل الثديين. وربما تحدث تجاعيد مرئية وملموسة للجلد. فهناك دائماً احتمال وجود بقايا جلدية زائدة أو "الثنايا الجلدية" في نهايات الشقوق عندما يكون هناك جلد زائد عن الحاجة. وقد يتحسن هذا مع مرور الوقت، أو يمكن تصحيحه جراحياً.

تورم الجلد/تغير لون الجلد: قد تحدث بعض الكدمات والتورم بشكل طبيعي. قد يبدو الجلد الموجود في مكان إجراء الجراحة أو بالقرب منه إما فاتحاً أو داكن عن الجلد المحيط. على الرغم من أن حدوث التورم وتغير لون الجلد أمرين غير شائعين إلا أنه قد يستمران لفترات طويلة من الزمن وفي حالات نادرة قد يستمران دائماً.

حساسية الجلد: قد تحدث حكة أو آلام شديدة أو استجابات مبالغ فيها قد تصل لارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة بعد الجراحة. وعادة ما يتم علاج هذه الأعراض أثناء مرحلة التعافي ولكن في حالات نادرة قد تكون مزمنة.

انفصال الجرح الرئيسي (التفزر): قد تنفصل حواف الجرح وتنفذ الخيوط الجراحية أماكن تثبيتها على جانبي مكان الجرح. في حالة حدوث ذلك، من الضروري اتباع طرق علاج إضافية بما في ذلك التدخل الجراحي.

خياطة الجرح: تستخدم معظم التقنيات الجراحية الخياطة العميقة. قد تلاحظ هذه الخياطة بعد إجراء العملية الجراحية. وقد تخترق الخياطة الجلد تلقائياً أو تصبح مرئية أو تسبب تهيجاً للجلد مما يتطلب إزالته.

تأخر التعافي: من الممكن حدوث تمزق في الجرح أو تأخر التئام الجروح. وقد لا تلتئم بعض مناطق الجلد بشكل طبيعي وقد تستغرق وقتاً طويلاً حتى تتمثل للشفاء. وربما تفقد الإحساس بهذه المناطق من الجلد. قد يتطلب ذلك تغيير الضمادات بصورة متكررة أو إجراء عملية جراحية إضافية لإزالة الأنسجة غير الملتهمة. فالمرضى الذين يعانون من نقص في تدفق الدم المتجه إلى هذه الأنسجة نتيجة لجراحات سابقة أو العلاج الإشعاعي أكثر عرضة لخطر تأخر التئام الجروح وحدوث نتائج جراحية سيئة. كما أن المدخنون أكثر عرضة لخطر إزالة الجلد ومضاعفات التئام الجروح.

تلف البنية الداخلية: من المحتمل أن تحدث الإصابة بتلف البنية الداخلية للأعصاب والأوعية الدموية والعضلات والرئتين (الاسترواح الصدري) أثناء أي إجراء جراحي. تختلف احتمالية حدوث ذلك وفقاً لنوع العملية الجراحية الذي يتم إجراؤه. وقد تكون الإصابة بتلف البنية الداخلية مؤقتاً أو دائماً.

النخر الدهني: أحياناً قد تموت الأنسجة الدهنية الموجودة في أعماق الجلد. وقد ينتج عن ذلك تصلب بعض المناطق داخل الجلد. وقد يكون من الضروري إجراء جراحة إضافية لإزالة مناطق النخر الدهني. وهناك احتمالية لحدوث اختلاف في شكل الجلد نتيجة للإصابة بنخر الدهون.

الورم المصلي (سيروما): نادراً ما قد تتراكم السوائل بين الجلد والأنسجة السفلية بعد الجراحة أو التعرض لصدمة ما أو ممارسة التمارين الرياضية القوية. في حالة حدوث هذه الحالة، قد يتطلب الأمر الخضوع لعمليات جراحية إضافية لتصريف السوائل. **التخدير الجراحي:** ينطوي كل من التخدير الموضعي والتخدير العام على المخاطر. وهناك احتمال حدوث مضاعفات وإصابات وربما تصل إلى الوفاة نتيجة لأشكال التخدير الجراحي أو التخدير الواعي.

الصدمة: في حالات نادرة، يمكن أن يتسبب الخضوع لعملية جراحية في حدوث صدمة شديدة، لا سيما عند إجراء عمليات متعددة أو واسعة النطاق. وعلى الرغم من أن المضاعفات الخطيرة نادرة الحدوث، إلا أن الإصابة بالالتهابات أو فقدان السوائل المفرط يمكن أن يؤدي إلى إعياء شديد وحتى الموت. في حالة حدوث صدمة جراحية، سيطلب الأمر الإقامة في المستشفى والخضوع لعلاج إضافي. **الآلام:** ستشعر ببعض الألم بعد إجراء العملية الجراحية. قد تتفاوت درجة شدة الألم ومدته وقد يستمر بعد ظهور ندبات في الثدي. وفي حالات نادرة، قد تصاب بالآلام مزمنة وذلك نتيجة لتراكم النسيج الندبي حول الأعصاب أو بسبب تمدد الأنسجة.

المضاعفات القلبية والرئوية: قد تحدث المضاعفات الرئوية عند الإصابة بالجلطات الدموية (الصمات الرئوية) وترسب الدهون (الصمات الدهنية) أو الانهيار الجزئي للرئتين بعد التخدير العام (انخفاض الرئة). يمكن أن تهدد الصمات الرئوية حياة المريض أو ربما تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. قد يؤدي الخمول وبعض الحالات الأخرى إلى زيادة حدوث الجلطات الدموية التي تنتقل إلى الرئتين مما يتسبب في حدوث جلطة دموية كبيرة قد تؤدي إلى الوفاة. من الضروري التحدث مع طبيبك بشأن الإصابة السابقة بتورم الساقين أو الجلطات الدموية والتي قد تؤدي إلى ذلك. تعتبر المضاعفات القلبية من المخاطر المحتملة لأي عملية جراحية أو تخدير،

Skin Discoloration / Swelling: Some bruising and swelling normally occur. The skin in or near the surgical site can appear either lighter or darker than surrounding skin. Although uncommon, swelling and skin discoloration may persist for long periods of time and, in rare situations, may be permanent.

Skin Sensitivity: Itching, tenderness, or exaggerated responses to hot or cold temperatures may occur after surgery. Usually this resolves during healing, but in rare situations it may be chronic.

Major Wound Separation: Wounds may separate after surgery. Should this occur, additional treatment including surgery may be necessary.

Sutures: Most surgical techniques use deep sutures. You may notice these sutures after your surgery. Sutures may spontaneously poke through the skin, become visible or produce irritation that requires suture removal.

Delayed Healing: Wound disruption or delayed wound healing is possible. Some areas of the skin may not heal normally and may take a long time to heal. Areas of skin may die. This may require frequent dressing changes or further surgery to remove the non-healed tissue. Individuals who have decreased blood supply to tissue from past surgery or radiation therapy may be at increased risk for delayed wound healing and poor surgical outcome. Smokers have a greater risk of skin loss and wound healing complications.

Damage to Deeper Structures: There is the potential for injury to deeper structures including nerves, blood vessels, muscles, and lungs (pneumothorax) during any surgical procedure. The potential for this to occur varies according to the type of procedure being performed. Injury to deeper structures may be temporary or permanent.

Fat Necrosis: Fatty tissue found deep in the skin might die. This may produce areas of firmness within the skin. Additional surgery to remove areas of fat necrosis may be necessary. There is the possibility of contour irregularities in the skin that may result from fat necrosis.

Seroma: Infrequently, fluid may accumulate between the skin and the underlying tissues following surgery, trauma or vigorous exercise. Should this problem occur, it may require additional procedures for drainage of fluid.

Surgical Anesthesia: Both local and general anesthesia involve risk. There is the possibility of complications, injury, and even death from all forms of surgical anesthesia or sedation.

Shock: In rare circumstances, your surgical procedure can cause severe trauma, particularly when multiple or extensive procedures are performed. Although serious complications are infrequent, infections or excessive fluid loss can lead to severe illness and even death. If surgical shock occurs, hospitalization and additional treatment would be necessary.

Pain: You will experience pain after your surgery. Pain of varying intensity and duration may occur and persist after breast scars. Chronic pain may occur very infrequently from nerves becoming trapped in scar tissue or due to tissue stretching.

Cardiac and Pulmonary Complications: Pulmonary complications may occur secondarily to both blood clots (pulmonary emboli), fat deposits (fat emboli) or partial collapse of the lungs after general anesthesia. Pulmonary emboli can be life-threatening or fatal in some circumstances. Inactivity and other conditions may increase the incidence of blood clots traveling to the lungs causing a major blood clot that may result in death. It is important to discuss with your physician any past history of swelling in your legs or blood clots that may contribute to this condition. Cardiac complications are a risk with any surgery and anesthesia, even in patients without symptoms. If you experience shortness of breath, chest pain, or unusual heart beats, seek medical attention immediately. Should any of these complications occur, you may require hospitalization and additional treatment.

Allergic Reactions: In rare cases, local allergies to tape, suture material and glues, blood products, topical preparations or injected agents have been reported. Serious systemic reactions including shock (anaphylaxis) may occur in response to drugs used during surgery and prescription medicines. Allergic reactions may require additional treatment.

Asymmetry: Some breast asymmetry naturally occurs in most people. Differences in terms of breast and nipple shape, size, or symmetry may also occur after surgery.

حتى في المرضى الذين لا يعانون من أي أعراض. إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو اضطراب غير معتاد في ضربات القلب، فاتصل على الفور بالرعاية الطبية. في حالة حدوث أي من هذه المضاعفات، قد تحتاج إلى الإقامة في المستشفى والخضوع لعلاج إضافي.

تفاعلات تحسسية: في بعض الحالات النادرة، تم الإبلاغ عن الإصابة بحساسية موضعية للشريط اللاصق أو مواد الخياطة أو المواد اللاصقة أو مشتقات الدم أو المستحضرات الموضعية أو المواد المحقونة. وقد تحدث تفاعلات تحسسية جهازية خطيرة تشمل الصدمة (الحساسية المفرطة) نتيجة للأدوية المستخدمة أثناء الجراحة والأدوية الموصوفة. وقد تتطلب تفاعلات الحساسية علاجاً إضافياً.

عدم التماثل: قد يحدث عدم تماثل في الثدي بشكل طبيعي لدى معظم الناس. قد يحدث أيضاً بعض الاختلافات في شكل وحجم الثدي والحلمة أو تباينهما بعد الجراحة.

التورم المستمر (الوذمة اللمفية): من المحتمل حدوث تورم مستمر في الساقين بعد الجراحة.

النتائج غير المرضية: على الرغم من أنه يمكن توقع النتائج الجيدة، ولكن ليس هناك ضمان أو التزام صريح أو مستتر، على النتائج التي يمكن الحصول عليها. وقد تصاب بخيبة أمل من نتائج الجراحة. قد يحدث عدم تناسق في موقع الحلمة مع شكل وحجم الثدي، وتمزق الجرح، وعدم التئام الجرح، وفقدان الإحساس بعد الجراحة. وقد يكون حجم الثدي غير مناسب. وقد تحدث ندبة جراحية غير مرضية. في بعض الحالات، قد لا يكون من الممكن الحصول على النتائج المثالية المرجوة من خلال إجراء جراحي واحد. وقد يكون من الضروري إجراء جراحة إضافية لتحسين النتائج.

التدخين، أو التعرض للتدخين السلبي، أو منتجات النيكوتين (لصقة، مضغ، بخاخ أنف):

إن المرضى الذين يدخنون أو يستخدمون منتجات التبغ أو النيكوتين (لصقة أو مضغ أو بخاخ الأنف) أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات جراحية كبيرة مثل موت الجلد وتأخر الشفاء وتندب إضافي. كما أن الأفراد المعرضون للتدخين السلبي معرضون أيضاً لخطر الإصابة بالمضاعفات المحتملة مثلهم مثل متعاطي النيكوتين. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للتدخين تأثير سلبي كبير على التعافي من التدخين، وزيادة النزيف نتيجة للسعال. كما أن الأفراد الذين لا يتعرضون لدخان السجائر أو المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أقل عرضة للإصابة بهذا النوع من المضاعفات. لذا، يُرجى الإشارة إلى حالتك الحالية فيما يتعلق بهذه العناصر الموضحة أدناه: -

أنا غير مدخن ولا استخدم منتجات النيكوتين. أنا على علم بالمخاطر المحتملة للتعرض للتدخين السلبي الذي يسبب مضاعفات جراحية.

أنا مدخن أو استخدم التبغ/ منتجات النيكوتين. أنا على علم بمخاطر حدوث مضاعفات جراحية بسبب التدخين أو استخدام منتجات النيكوتين.

لقد دخن وتوقفت عن التدخين منذ _____ تقريباً. أنا أفهم أنني قد لما زلت أعاني من تأثيرات التدخين في جسمي وبالتالي فإنه من المحتمل حدوث مخاطر نتيجة لذلك، إذا لم ينقضي الوقت الكافي.

من المهم الامتناع عن التدخين قبل 6 أسابيع على الأقل من إجراء العملية الجراحية وحتى يخبرك الطبيب بأن العودة إلى التدخين مرة أخرى ستكون آمنة، إذا رغبت في ذلك. وأقر بأنني سأخبر طبيبي إذا واصلت التدخين خلال هذه الفترة، وأتفهم أنه يمكن تأخير ميعاد الجراحة إن أمكن حفاظاً على سلامتي.

التدخل مع إجراءات إعداد خرائط لمتابعة عمل الغدد الليمفاوية: ويمكن أن تؤثر إجراءات جراحة الثدي التي تنطوي على قطع أنسجة من الثدي، على غرار خزعة الثدي، على الإجراءات التشخيصية لتحديد أنابيب تصريف الغدد الليمفاوية لنسيج الثدي لتحديد مرحلة سرطان الثدي.

الأدوية والمكملات الغذائية العشبية: هناك تفاعلات ضارة محتملة تحدث نتيجة تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأعشاب و/أو الأدوية الموصوفة. فالأسبرين والأدوية التي تحتوي على الأسبرين تؤثر على التجلط ويمكن أن تسبب زيادة النزيف. وتشمل أيضاً مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل موترين، أدفيل، وأليف. ومن الضروري عدم وقف تناول الأدوية التي تؤثر على الصفائح الدموية، مثل بلافيكس، الذي يستخدم بعد تركيب الدعامات. ومن الضروري أن تخبر طبيبك إذا كنت ركب دعامات من قبل وتتناول دواء بلافيكس. فقد يؤدي وقف تناول بلافيكس إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية وحتى يؤدي إلى الموت. تأكد من الاستفسار من طبيبك بشأن أي تفاعلات دوائية قد تحدث مع الأدوية التي تتناولها بالفعل. وإذا أصبت بأي رد فعل، فتوقف عن تناول الأدوية فوراً واتصل بجراح التجميل للحصول على مزيد من التعليمات. إذا كان رد الفعل شديداً، فانتقل فوراً إلى أقرب مستشفى للطوارئ. عند تناول مسكنات الألم الموصوفة لك بعد الجراحة، يجب معرفة أنها يمكن أن تؤثر على عملية التفكير والتركيز. لا يمكنك قيادة السيارة أو تشغيل معدات معقدة أو اتخاذ أي قرارات مهمة أو شرب أي منتجات كحولية أثناء تناول هذه الأدوية. تأكد من تناول الأدوية الموصوفة لك وفقاً لتعليمات الطبيب فقط.

التعرض لأشعة الشمس المباشر أو لجهاز تسمير البشرة: للتعرض لأشعة الشمس آثار ضارة على البشرة. قد يؤدي تعريض المناطق المعالجة للشمس إلى زيادة الندبات وتغير اللون وتأخر التئام الجروح. يجب على المرضى الذين يسعون للحصول على لون للبشرة، سواء في الهواء الطلق أو في صالونات التجميل، إبلاغ الطبيب وتأخير العلاج، أو تجنب التسمير حتى يسمح الطبيب باستئنافه. يحدث التأثير الضار للتعرض لأشعة الشمس حتى مع استخدام واقي الشمس أو بارتداء الملابس.

خطط السفر: تحمل أي عملية جراحية خطر حدوث مضاعفات مما قد يؤخر الشفاء ويؤخر عودتك إلى الحياة الطبيعية. لذا يُرجى إبلاغ الجراح بأي خطط للسفر، أو التزامات هامة مقرر أو محددة بالفعل، أو أي متطلبات زمنية مهمة بالنسبة لك، بحيث يمكن أن يحدد التوقيت المناسب للجراحة. ولا توجد ضمانات بأنك ستتمكن من استئناف جميع الأنشطة في الإطار الزمني المطلوب.

أمراض الثدي لدى الذكور: قد تحدث الإصابة بأمراض الثدي وسرطان الثدي بعيداً عن الجراحة. فإذا وجدت كتلة في الثدي، اطلب الفحص الطبي على الفور للحصول على الرعاية المناسبة.

النتائج طويلة المدى: قد تحدث تغييرات لاحقة في مظهر جسمك نتيجة الشيخوخة أو التعرض لأشعة الشمس أو فقدان الوزن أو زيادته أو الحمل أو انقطاع الطمث أو أي ظروف أخرى لا تتعلق بالجراحة.

Persistent Swelling (Lymphedema): Persistent swelling in the legs can occur following surgery.

Unsatisfactory Result: Although good results are expected, there is no guarantee or warranty expressed or implied, on the results that may be obtained. You may be disappointed with the results of surgery. Asymmetry in nipple location, unanticipated breast shape and size, wound disruption, poor healing, and loss of sensation may occur after surgery. Breast size may be incorrect. Unsatisfactory surgical scar location may occur. In some situations, it may not be possible to achieve optimal results with a single surgical procedure. It may be necessary to perform additional surgery to improve your results.

Smoking, Second-Hand Smoke Exposure, Nicotine Products (Patch, Gum, Nasal Spray):

Patients who are currently smoking or use tobacco or nicotine products (patch, gum, or nasal spray) are at a greater risk for significant surgical complications of skin dying, delayed healing and additional scarring. Individuals exposed to second-hand smoke are also at potential risk for similar complications attributable to nicotine exposure. Additionally, smoking may have a significant negative effect on anesthesia and recovery from anesthesia, with coughing and possibly increased bleeding. Individuals who are not exposed to tobacco smoke or nicotine-containing products have a significantly lower risk of this type of complication. Please indicate your current status regarding these items below :

☐ I am a non-smoker and do not use nicotine products. I understand the potential risk of second-hand smoke exposure causing surgical complications.

☐ I am a smoker or use tobacco / nicotine products. I understand the risk of surgical complications due to smoking or use of nicotine products.

☐ I have smoked and stopped approximately _____ ago. I understand I may still have the effects and therefore risks from smoking in my system, if not enough time has lapsed.

It is important to refrain from smoking at least 6 weeks before surgery and until your physician states it is safe to return, if desired. I acknowledge that I will inform my physician if I continue to smoke within this time frame, and understand that for my safety, the surgery, if possible, may be delayed.

Interference with Sentinel Lymph Node Mapping Procedures: Breast surgery procedures that involve cutting through breast tissue, similar to a breast biopsy, can potentially interfere with diagnostic procedures to determine lymph node drainage of breast tissue to stage breast cancer.

Medications and Herbal Dietary Supplements: There are potential adverse reactions that occur as the result of taking over-the-counter, herbal, and/or prescription medications. Aspirin and medications that contain aspirin interfere with clotting and can cause more bleeding. These include non-steroidal anti-inflammatories such as Motrin, Advil, and Alleve. It is very important not to stop drugs that interfere with platelets, such as Plavix, which is used after a stent. It is important if you have had a stent and are taking Plavix that you inform the plastic surgeon. Stopping Plavix may result in a heart attack, stroke and even death. Be sure to check with your physician about any drug interactions that may exist with medications which you are already taking. If you have an adverse reaction, stop the drugs immediately and call your plastic surgeon for further instructions. If the reaction is severe, go immediately to the nearest emergency room. When taking the prescribed pain medications after surgery, realize that they can affect your thought process and coordination. Do not drive, do not operate complex equipment, do not make any important decisions and do not drink any alcohol while taking these medications. Be sure to take your prescribed medication only as directed.

Sun Exposure – Direct or Tanning Salon: The effects of the sun are damaging to the skin. Exposing the treated areas to sun may result in increased scarring, color changes, and poor healing. Patients who tan, either outdoors or in a salon, should inform their surgeon and either delay treatment, or avoid tanning until the surgeon says it is safe to resume. The damaging effect of sun exposure occurs even with the use sun block or clothing coverage.

Travel Plans: Any surgery holds the risk of complications that may delay healing and delay your return to normal life. Please let the surgeon know of any travel plans, important commitments already scheduled or planned, or time demands that are important to you, so that appropriate timing of surgery can occur. There are no guarantees that you will be able to resume all activities in the desired time frame.

Breast Disease in Male Patients: Breast disease and breast cancer can occur independently of surgery. If a mass is detected, seek professional examination immediately to obtain proper care.

العلاقات الحميمة بعد إجراء الجراحة: تتضمن الجراحة تجلط الدم وقد يؤدي النشاط المتزايد من أي نوع إلى فتح هذه الأوعية مما يؤدي إلى حدوث نزيف أو تكتل دموي. وقد يتسبب النشاط الذي يزيد من معدل ضربات القلب أو النبض في حدوث كدمات وتورم إضافي والحاجة إلى إعادة الجراحة والسيطرة على النزيف. لذا، فمن الضروري الامتناع عن الأنشطة البدنية الحميمة حتى يسمح لك طبيبك بذلك.

اضطرابات الصحة النفسية والجراحة الانتقائية: من المهم أن يكون لدى جميع المرضى الذين يسعون للخضوع لعملية جراحية انتقائية توقعات واقعية تركز على التحسين وليس الكمال. وفي بعض الأحيان لا يمكن تجنب المضاعفات أو النتائج غير المرضية، وقد يتطلب الأمر إجراء جراحة إضافية وغالباً ما تكون مرهقة. لذلك يُرجى مناقشة أي ما إذا كنت قد أصبت بالاكتئاب العاطفي أو اضطرابات الصحة النفسية مع الطبيب بوضوح قبل إجراء العملية الجراحية. على الرغم من أن العديد من الأفراد قد يستفيدون نفسياً من نتائج الجراحة الانتقائية، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بتأثيراتها على الصحة النفسية.

الجراحات الإضافية الضرورية (إعادة الجراحة)

هناك العديد من الحالات المتغيرة التي قد تؤثر على نتيجة جراحة تصحيح تضخم الثدي على المدى البعيد.

وقد تكون الجراحة الثانوية ضرورية لشد الثدي أو إعادة تحديد موضعه. في حالة حدوث مضاعفات، قد يكون من الضروري إجراء جراحة إضافية أو اتباع طرق علاجية أخرى. على الرغم من أن المخاطر والمضاعفات تحدث بشكل غير متكرر، إلا أن المخاطر المذكورة ترتبط بشكل خاص بتصحيح تضخم الثدي. يمكن أن تحدث مضاعفات ومخاطر أخرى ولكنها ليست شائعة. إن ممارسة الطب والجراحة ليس علم دقيق النتائج. على الرغم من أنه يمكن توقع النتائج الجيدة، ولكن ليس هناك ضمان أو التزام صريح أو مستتر، بالنتائج التي يمكن الحصول عليها. في بعض الحالات، قد لا يكون من الممكن الحصول على النتائج المثالية المرجوة من خلال إجراء جراحي واحد.

التزام المريض

من الضروري اتباع كافة إرشادات الطبيب بعناية وهذا أمر أساسي لنجاح الجراحة والحصول على النتائج المرجوة. كما أنه من المهم عدم تعرض الشقوق الجراحية للقوة المفرطة أو التورم أو الجرح أو الحركة أثناء فترة التعافي. ولابد من تقليل النشاط الشخصي والمهني. يجب عدم إزالة الضمادات الواقية وأنابيب التصريف ما لم يطلب منك طبيب التجميل ذلك. يعتمد نجاح وظائف ما بعد الجراحة على كل من الجراحة والرعاية اللاحقة. فالنشاط البدني الذي يزيد من سرعة النبضات أو ومعدل ضربات القلب قد يسبب كدمات، وتورم، وتراكم للسوائل، والحاجة إلى إعادة إجراء الجراحة. فمن الضروري أن تمتنع عن ممارسة النشاطات الجسدية الحميمة بعد الجراحة حتى يسمح لك طبيبك بذلك. ومن المهم أن تتبع تعليمات الرعاية اللاحقة، والامتنال إليها وتعزيز مرحلة شفائك بعد الجراحة.

التأمين الصحي

تستبعد معظم شركات التأمين الصحي تغطية تكاليف العمليات الجراحية التجميلية أو تغطية تكاليف علاج أي مضاعفات تنتج عنها. لذا، يرجى مراجعة كتيب معلومات الاشتراك في التأمين الصحي الخاص بك بعناية. كما تستبعد معظم خطط التأمين تغطية الجراحات الثانوية أو التصحيحية بسبب حدوث مضاعفات نتيجة لإجراء الجراحة التجميلية.

إخلاء المسؤولية

تستخدم وثائق الموافقة المستنيرة لنقل المعلومات حول العلاج الجراحي المقترح للمرض أو الحالة بالإضافة إلى الكشف عن المخاطر المحتملة وطرق العلاج البديلة، بما في ذلك عدم إجراء تدخل جراحي. فمن خلال وثائق الموافقة المستنيرة يمكن تحديد مبادئ الكشف عن المخاطر المحتملة والتي يجب أن تلبي بشكل عام احتياجات معظم المرضى في معظم الحالات. ومع ذلك، لا تشمل وثائق الموافقة المستنيرة كافة الأساليب الأخرى للرعاية والمخاطر المحتملة. وقد يخبرك جراح التجميل بمعلومات إضافية أو مختلفة بناءً على العوامل التي تتوافق مع حالتك والحالة الصحية الحالية. وليس الغرض من وثائق الموافقة المستنيرة أن تحدد أو تستخدم كمعيار للرعاية الطبية. ولكن يمكن تحديد معايير الرعاية الطبية على أساس جميع الوقائع المتعلقة بكل حالة فردية، وهي عرضة للتغيير مع تغير الظروف الصحية والتكنولوجيا ومع تطور أنماط الممارسة الطبية.

لذا، من المهم أن تقرأ المعلومات الواردة أعلاه بعناية وفهمها فهماً تاماً.

يجب أن تحصل على الإجابة على جميع استفساراتك قبل التوقيع بالموافقة في الصفحة التالية.

Long-Term Results: Subsequent alterations in the appearance of your body may occur as the result of aging, sun exposure, weight loss, weight gain, pregnancy, menopause or other circumstances not related to your surgery.

Intimate Relations After Surgery: Surgery involves coagulating of blood vessels and increased activity of any kind may open these vessels leading to a bleed, or hematoma. Activity that increases your pulse or heart rate may cause additional bruising, swelling, and the need for return to surgery and control bleeding. It is wise to refrain from intimate physical activities until your physician states it is safe.

Mental Health Disorders and Elective Surgery: It is important that all patients seeking to undergo elective surgery have realistic expectations that focus on improvement rather than perfection. Complications or less than satisfactory results are sometimes unavoidable, may require additional surgery and often are stressful. Please openly discuss with your surgeon, prior to surgery, any history that you may have of significant emotional depression or mental health disorders. Although many individuals may benefit psychologically from the results of elective surgery, effects on mental health cannot be accurately predicted.

ADDITIONAL SURGERY NECESSARY (Re-Operations)

There are many variable conditions that may influence the long-term result of gynecomastia. Secondary surgery may be necessary to perform additional tightening or repositioning of the breasts. Should complications occur, additional surgery or other treatments may be necessary. Even though risks and complications occur infrequently, the risks cited are particularly associated with gynecomastia. Other complications and risks can occur but are even more uncommon. The practice of medicine and surgery is not an exact science. Although good results are expected, there is no guarantee or warranty expressed or implied, on the results that may be obtained. In some situations, it may not be possible to achieve optimal results with a single surgical procedure.

PATIENT COMPLIANCE

Follow all physician instructions carefully; this is essential for the success of your outcome. It is important that the surgical incisions are not subjected to excessive force, swelling, abrasion, or motion during the time of healing.

Personal and vocational activity needs to be restricted. Protective dressings and drains should not be removed unless instructed by your plastic surgeon. Successful post-operative function depends on both surgery and subsequent care. Physical activity that increases your pulse or heart rate may cause bruising, swelling, fluid accumulation and the need for return to surgery. It is wise to refrain from intimate physical activities after surgery until your physician states it is safe. It is important that you participate in follow-up care, return for aftercare, and promote your recovery after surgery.

HEALTH INSURANCE

Most health insurance companies exclude coverage for cosmetic surgical operations or any resulting complications. Please carefully review your health insurance subscriber-information pamphlet. Most insurance plans exclude coverage for secondary or revisionary surgery due to complications of cosmetic surgery.

DISCLAIMER

Informed-consent documents are used to communicate information about the proposed surgical treatment of a disease or condition along with disclosure of risks and alternative forms of treatment(s), including no surgery. The informed-consent process attempts to define principles of risk disclosure that should generally meet the needs of most patients in most circumstances.

However, informed-consent documents should not be considered all inclusive in defining other methods of care and risks encountered. Your plastic surgeon may provide you with additional or different information that is based on all the facts in your particular case and the current state of medical knowledge.

Informed-consent documents are not intended to define or serve as the standard of medical care. Standards of medical care are determined on the basis of all of the facts involved in an individual case and are subject to change as scientific knowledge and technology advance and as practice patterns evolve.

It is important that you read the above information carefully and have all of your questions answered before signing the consent on the next page.

الموافقة المستنيرة- جراحة تصحيح تضخم الثدي عند الذكور

الموافقة على إجراء العملية الجراحية/ الجراحة أو العلاج

1- أفوض بموجب هذه الموافقة الدكتور _____ والمساعدين الذين قد تم اختيارهم لإجراء العملية الجراحية أو العلاج التالي: جراحة تصحيح تضخم الثدي عند الذكور (جراحة تصغير الثدي عند الرجال) وقد تلقيت صحيفة المعلومات التالية:

- الموافقة المستنيرة- جراحة تصحيح تضخم الثدي عند الذكور
- أنتني على علم بأنه خلال العملية الجراحية والعلاج الطبي أو التخدير، قد تستلزم الظروف غير المتوقعة القيام بإجراءات مختلفة عن الإجراءات المذكورة أعلاه. لذلك أفوض الطبيب والمساعدين أو المعنيين المذكورين أعلاه للقيام بمثل هذه الإجراءات الأخرى التي تخضع لتقديرهم المهني والتي يرونها ضرورية ومطلوبة. وتشمل السلطة الممنوحة بموجب هذه الفقرة جميع الحالات التي تتطلب علاجاً وغير معلومة للطبيب في وقت إجراء العملية الجراحية.
- أوافق على طريقة التخدير التي يراها الطبيب ضرورية ومناسبة. وأنتني على علم بأن كل طرق التخدير تنطوي على مخاطر واحتمال حدوث مضاعفات، وإصابات، وأحياناً قد تؤدي إلى الموت.
- أفهم ما يستطيع أو لا يستطيع الجراح القيام به، وأعلم أنه لا توجد أي ضمانات أو التزامات، ضمنية أو محددة بشأن النتائج المترتبة على العملية الجراحية. وقد أتيحت لي الفرصة لتوضيح أهدافي وفهم أي النتائج المرجوة واقعية وأبها غير واقعية. وقد تمت الإجابة على جميع استفساراتي، وأنا على علم بالمخاطر الكامنة (المحددة) للعمليات الجراحية التي أسعى إليها، فضلاً عن المخاطر والمضاعفات الإضافية والفوائد وطرق العلاج البديلة. وأنتني على علم بكل ما سبق، وأختار المضي قدماً.
- أوافق على أن يتم التقاط صور أو تصوير فيديو قبل وأثناء وبعد العملية (العمليات) أو الإجراء (الإجراءات) التي سيتم اتخاذها، بما في ذلك الأجزاء المناسبة من جسمي، للأغراض الطبية أو العلمية أو التعليمية، شريطة ألا يتم الكشف عن هويتي من خلال الصور.
- أوافق على وجود ملاحظتين في غرفة العمليات بهدف تطوير الدراسات الطبية.
- أوافق على التخلص من أي نسيج أو أجهزة طبية أو أجزاء من الجسم قد يتم إزالتها.
- أوافق على استخدام مشتقات الدم إذا ما اعتبرها الجراح و/أو مساعده ضرورية، وأعلم أن استخدامها قد ينطوي على مخاطر كبيرة صحية محتملة.
- أفوض بالإفصاح عن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي للوكالات المناسبة للإبلاغ القانوني وتسجيل المستلزمات الطبية، إن أمكن.
- أتفهم أن أتعاب الجراح منفصلة عن رسوم التخدير والمستشفى، وأنتني أوافق على هذه الرسوم. وإذا كان الإجراء الثانوي ضرورياً، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من النفقات.
- أعلم أن عدم إجراء العملية الجراحية هو أمر اختياري.
- وقد تم شرح الإجراءات المتبعة وفهمت التالي:
أ- العلاج أو العملية الجراحية المتبعة
ب- قد تكون هناك إجراءات أو طرق بديلة للعلاج
ج- هناك مخاطر قد تنجم عن العملية الجراحية أو العلاج المقترح
أوافق على طريقة العلاج أو العملية الجراحية والبنود المذكورة أعلاه (1-12).

أنا راضٍ وموافق على هذا الشرح.

رقم الملف: _____ التاريخ: _____
اسم المريض بالكامل: _____ توقيع المريض: _____
الشاهد _____ التاريخ: _____
التوقيع فوق الاسم المطبوع
الدكتور/ _____ التاريخ: _____
التوقيع فوق الاسم المطبوع

INFORMED CONSENT – GYNECOMASTIA SURGERY

CONSENT FOR SURGERY / PROCEDURE or TREATMENT

1. I hereby authorize Dr. _____ and such assistants as may be selected to perform the following procedure or treatment: GYNECOMASTIA SURGERY (MALE BREAST REDUCTION)
I have received the following information sheet:

INFORMED CONSENT - GYNECOMASTIA SURGERY

2. I recognize that during the course of the operation and medical treatment or anesthesia, unforeseen conditions may necessitate different procedures than those above. I therefore authorize the above physician and assistants or designees to perform such other procedures that are in the exercise of his or her professional judgment necessary and desirable. The authority granted under this paragraph shall include all conditions that require treatment and are not known to my physician at the time the procedure is begun.
3. I consent to the administration of such anesthetics considered necessary or advisable. I understand that all forms of anesthesia involve risk and the possibility of complications, injury, and sometimes death.
4. I understand what my surgeon can and cannot do, and I understand there are no warranties or guarantees, implied or specific about my outcome. I have had the opportunity to explain my goals and understand which desired outcomes are realistic and which are not. All of my questions have been answered, and I understand the inherent (specific) risks of the procedures I seek, as well as those additional risks and complications, benefits, and alternatives. Understanding all of this, I elect to proceed.
5. I consent to be photographed or televised before, during, and after the operation(s) or procedure(s) to be performed, including appropriate portions of my body, for medical, scientific or educational purposes, provided my identity is not revealed by the pictures.
6. For purposes of advancing medical education, I consent to the admittance of observers to the operating room.
7. I consent to the disposal of any tissue, medical devices or body parts which may be removed.
8. I consent to the utilization of blood products should they be deemed necessary by my surgeon and/or his/her appointees, and I am aware that there are potential significant risks to my health with their utilization.
9. I authorize the release of my Social Security number to appropriate agencies for legal reporting and medical device registration, if applicable.
10. I understand that the surgeon's fees are separate from the anesthesia and hospital charges, and the fees are agreeable to me. If a secondary procedure is necessary, further expenditure will be required.
11. I realize that not having the operation is an option.
12. IT HAS BEEN EXPLAINED TO ME IN A WAY THAT I UNDERSTAND:
 - a. THE ABOVE TREATMENT OR PROCEDURE TO BE UNDERTAKEN
 - b. THERE MAY BE ALTERNATIVE PROCEDURES OR METHODS OF TREATMENT
 - c. THERE ARE RISKS TO THE PROCEDURE OR TREATMENT PROPOSED

I CONSENT TO THE TREATMENT OR PROCEDURE AND THE ABOVE LISTED ITEMS (1-12).
I AM SATISFIED WITH THE EXPLANATION.

File Number: _____

Date: _____

Patient's Full Name: _____ Patient's Signature: _____

Witness _____ Date: _____

Signature over Printed Name

DR. _____ Date: _____

Signature over Printed Name